

女性比男性更延遲診斷膀胱癌

膀胱癌的發生率越來越高，雖然目前南部沿海的民眾已經沒有使用含砷地下水，如果小時候有使用過，長大後就可能增加膀胱癌的發生。膀胱癌如果不是早期診斷利用外科手術治療、放射治療，一旦轉移後預後不佳，所以早期診斷早期治療非常重要。但是依據美國芝加哥大學的 Cohn 醫師所做的研究報告發現女性膀胱癌與死亡率高於男性，其中一個原因就是女性比男性更延遲診斷。

他從 2004 年到 2010 年分析了 7649 名(包含 5416 名男性及 2233 名女性)有血尿後來被診斷為膀胱癌的病患，結果發現女性呈現血尿到被診斷為膀胱癌是 85.4 天，而男性只有 73.6 天，雖然只有兩個禮拜的區別，但是預後卻完全不同，延遲 6 個月被診斷女性是 17.3%，男性只有 14.1%，統計學上有其意義。

女性有血尿常常被診斷是尿道發炎引起，尤其是又有月經來時常常分不清楚，這也是被遲延診斷的原因，因為被遲延診斷導致預後不佳，在男性也有相同的情形。所以病患有血尿時，尤其是女性不應該只當作膀胱發炎來診斷，而要持續的追蹤，尤其是沒有疼痛的血尿