

血管攝影檢查護理指導

壹、目的：

- 一、協助診斷受檢部位有無腫瘤、畸形、出血等病變。
- 二、肝臟腫瘤栓塞診斷、腦血管動靜脈畸瘤栓塞治療等。
- 三、咳血或腸胃道出血診斷。

貳、檢查前之準備：

- 一、須填檢查同意書。
- 二、禁食時間（約需禁食六-八小時）。
- 三、依檢查部位予以適當範圍之剃雉。
- 四、送檢查前依醫囑予以插導尿管或尿套使用。
- 五、更換檢查衣(檢查衣正穿)、排空膀胱。
- 六、檢查過程務必要有家屬陪伴。

參、檢查後護理及衛教：

- 一、返室後立刻監測生命徵象及末梢動脈。
- 二、觀察及比較兩側下肢體/上肢體末梢循環、皮膚溫度。
- 三、密切觀察穿刺部位有無出血、血腫情形，若有則需立刻報告醫護人員。
- 四、若穿刺部位為下肢
 - (一)告知臥床二十四小時的重要性，但除穿刺部位的關節不可彎曲外，另一側肢體可彎曲，並協助翻身。
 - (二)二十四小時內腹部不可用力，嚴禁仰臥坐起的動作及坐姿。
 - (三)頭部不可用力抬起；可睡枕頭(限一個)約 30 度，但須由照顧者協助扶起頭部。(不可以搖高床頭的方式)。
 - (四)如需側睡時，亦須由照顧者協助翻身。

- 五、如穿刺部位為上臂者，應三天內禁量血壓、治療及提重物為宜。
- 六、密切觀察尿量，並請配合醫囑進行記錄輸出入量記錄。
- 七、返室後若無其他因素即可進食，但需他人協助，並注意勿噎到。
- 八、固定穿刺傷口之膠布勿任意鬆動。
- 九、二十四小時後預移除膠布時，動作應輕柔，避免造成皮膚損傷。
- 十、鼓勵多喝水，以利顯影劑排出，但心臟或腎功能欠佳者，需依醫師指示。
- 十一、臥床期間若需要解大小便時，必須在床上使用便盆，可請護理人員或家屬協助，絕對不可以下床，以避免傷口出血。



寶建醫療 寶建醫院 關心您
社國法人 PAOCHIHEN HOSPITAL

總機：08-7665995

院址：屏東市中山路123號

救護專線：08-7330290

網址：www.paochien.com.tw

如有任何疑問，請洽健診中心！

時間：星期一～星期五

早上 08：00～11：40 ；下午 13：30～17：00

星期六 早上 08：00～11：40

直撥專線：08-7340581；或可撥總機 08-7665995 轉分機 3010、3016