

Lidocaine, Epinephrine

【I1ESPEA】Xylestesin-A 1.7mL/Syringe

ATC Code : N01BB52

中文名：熱利士得新一艾注射劑 « 3M »

適應症：局部麻醉。

藥理分類：Local Anesthetic

用法用量：主要成分：每一 mL 含
Lidocaine -----20mg
Epinephrine HCl-----0.015mg

1. ≥ 15 years old children and adults: 1~4 mL
2. < 15 years old Children:
20~30kg: 0.25~1 mL
30~45kg: 0.5~2mL
MAX: 5mg lidocaine /kg
3. Injection rate: $< 0.5\text{mL}/15\text{seconds}$

不良反應：金屬異常味道、耳鳴、頭痛、噁心。

交互作用：最近 14 天內曾使用 TAC(三環抗憂鬱藥)或 MAOI 者禁止使用。

注意事項：1.不可靜脈給藥，避免血管內直接注射。
2.局部給藥時，注射的速率每 15 秒鐘以不超過 0.5ml 為限。
3.經啟封的卡筒不能用於另一患者。
4.本品含無水亞硫酸鈉(anhydrous sodium sulfite)，氣喘患者須小心。

懷孕期：目前尚無相關之研究結果評斷用於孕婦之安全性，只有當醫師決定使用本藥之好處超過其危險性時才給予懷孕之婦女。

哺乳期：本品不會分泌至乳汁內。