

Fentanyl

【IFEN2】 Fentanyl[®] Injection 0.1mg/2mL/Amp *ATC Code : N01AH01*

【IIFEN2】 Fentanyl[®] Injection 0.1mg/2mL/Amp *ATC Code : N01AH01*

中文名： 吩坦尼注射液 《食藥署管制藥品製藥工廠》

適應症： 麻醉性鎮痛劑。

用法用量： **Adults:**

—Adjunct to general anesthesia:

2-50 mcg/kg IV, depending on the surgical procedures, additional doses may be given if necessary.

—Adjunct to regional anesthesia:

50-100 mcg IM or slow IV injection over 1-2 minutes when additional analgesia is required.

—Postoperative pain, restless, tachypnea, and emergence delirium:

50-100 mcg IM every 1-2 hours as needed.

—Preoperative medication:

50-100 mcg IM 30-60 minutes prior to surgery.

Pediatric patients:

— 2-12 yr:

During the induction and maintenance phase of general anesthesia, 2-3 mcg/kg IV or IM.

Analgesia: usually, 1-3 mcg/kg IV or IM, repeated every 30-60 min as needed, or continuous IV infusion of 1-5 mcg/kg/hr.

— > 12 yr:

Analgesia: 0.5-1 mcg/kg IV or IM, repeated every 30-60 minutes as needed.

不良反應： 腹痛、便秘、噁心、嘔吐、口乾、頭痛、胸痛、眩暈、虛弱、精神混亂、排尿困難等。

注意事項： 1.不得與其他藥品混合。必要時，可與氯化鈉或葡萄糖靜脈輸注液混合。
2.此稀釋液可裝於塑膠輸注容器。調配後 24 小時內要用完。

懷 孕 期： 1.尚未有關於懷孕婦女使用吩坦尼的充分數據。吩坦尼在懷孕早期會穿過胎盤。動物試驗已顯示出某些生殖毒性。
2.生產期間(包括剖腹生產)不建議使用(肌肉注射或靜脈注射)吩坦尼。因為吩坦尼會通過胎盤，且胎兒的呼吸中樞對鴉片類藥物特別敏感。若仍需使用吩坦尼，應備妥胎兒的解毒劑。

授 乳 期： 吩坦尼會排泄到人體乳汁中，因此投與本藥後的 24 小時內不建議授乳。

安 定 性： 調配後 24 小時

相容輸注液： D5W, NS。

儲 存： 室溫避光保存。