

Bupivacaine HCl

【I1MAR4H】 Marcaine® Spinal Heavy 0.5% 20mg/4mL/Amp *ATC Code : N01BB01*

中文名： 麻佳因脊椎麻醉注射液 0.5%(重型) «阿斯特捷利康»

適應症： 局部麻醉。

藥理分類： **Local Anesthetic.**

用法用量： Varies with the anesthetic procedure and individual patient response.

不良反應： 低血壓、心博徐緩及脊椎酸刺後頭痛。

注意事項：

- 1.本劑禁用於靜脈區域麻醉（即 Bier block），以避免本劑漏至止血器（tourniquet）而引起全身毒性反應。
- 2.本劑不可儲存於含金屬物之容器內過久，因被溶解之金屬離子可能會引起注射部位之腫脹。

懷 孕 期： 目前為止，還沒有特定生殖過程障礙（例如增加胎兒畸形之發生率）之報告。妊娠後期應減低劑量。

授 乳 期： Bupivacaine 會分泌至母乳中，但對嬰兒之致危險性極微。

儲 存： 2-25 °C 以下儲存，不可冷凍。本溶液不含防腐劑且容器打開後應立即使用。剩餘的溶液應棄置不用。本藥不建議再滅菌。

**** 包含於手術材料或麻醉技術內，全民健保不另給付。**