

Naloxone HCl

【IINALO】Naloxone® 0.4mg/1mL/Amp

ATC Code : V03AB15

中文名：解麻注射液 «健亞生技»

適應症：麻醉藥品過量之解毒劑。

藥理分類：**Antidote; Opioid Antagonist.**

用法用量：**Administration:** IV push, SC, IM injection, or IV infusion.

IV administration is recommended for emergency situations.

Indications and dosage regimens:

Opiate overdose:

—Adults:

0.4-2 mg IV/IM/SC, repeat every 2-3 minutes as needed; if no response after 10 mg, reconsider diagnosis of opioid toxicity.

—Pediatric patients:

0.01 mg/kg IV, then 0.1 mg/kg if needed; may give IM/SC in divided doses if IV route not available.

Postoperative opiate depression:

—Adults:

0.1-0.2 mg IV, repeat every 2-3 min as needed to desired degree of reversal; repeat doses may be needed within 1-2 hr depending on amount and type of opioid and time interval since last opioid administration.

—Pediatric patients:

Neonates: 0.01 mg/kg IV/IM/SC every 2-3 min to desired degree of reversal.

Children ≤17 yr: 0.005-0.01 mg IV every 2-3 min to desired degree of reversal.

Diagnosis of chronic opiate abuse (naloxone challenge test): for adults

—Inject 0.2 mg IV, observe for 30 sec for signs or symptoms of withdrawal; if no evidence of withdrawal, inject 0.6 mg IV, observe for additional 20 min.

—0.8 mg SC, observe for 20 min for signs or symptoms of withdrawal.

不良反應：低血壓、高血壓、心室性心搏過速及振顫、呼吸困難、肺水腫、心跳停止。

注意事項：大劑量之 Naloxone 可能會逆轉麻醉劑之止痛反應，因此其劑量須依患者之反應調整。

懷 孕 期：1.並無證據顯示本藥對胎兒造成傷害。因本品並未對孕婦進行良好的對照研究：鑑於動物之生殖研究並不能用於預知人類的反應，除非十分必要時才可使用本藥於孕婦。

2.對已知或懷疑有鴉片類藥品依賴性的孕婦使用本藥時，應權衡其利害得失，因為母體產生依賴性經常使胎兒也產生依賴性。

授 乳 期：Naloxone 尚未被證實是否經乳汁排出體外，授乳婦使用時應謹慎。

配 製：以 NS、D5W 稀釋，在 500 毫升溶液中加入 2mg，可產生 0.004mg/ml 之濃度，點滴靜脈注射。

安 定 性：稀釋的溶液應於 24 小時內使用完畢。

相 容 輸 注 液：D5W, NS

儲 存：25 °C 以下避光保存。