

白喉/百日咳/破傷風/小兒麻痺/b 型流行感冒嗜血桿菌

【I25IN11】公費 Pentaxim[®] 0.5mL/vial

ATC Code : J07CA06

【I25IN12】公費 Pentaxim[®] 0.5mL/vial

ATC Code : J07CA06

【I25IN13】公費 Pentaxim[®] 0.5mL/vial

ATC Code : J07CA06

【I25IN14】公費 Pentaxim[®] 0.5mL/vial

ATC Code : J07CA06

中文名：公費 第 1 劑五合一疫苗(5in1-1) «Sanofi»

適應症：適用於出生 2 個月至 7 歲孩童的主動免疫接種，以預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺及侵襲性 b 型嗜血桿菌疾病。

用法用量：**Administration:**

以**肌肉注射**方式接種。最好注射在大腿的前外側（中間三分之一的範圍）。

Recommended immunization schedule:

基礎接種：由二個月大開始，共接種 3 劑，每劑至少間隔 1 個月。

追加接種：基礎接種之後 1 年追加注射 1 劑，意即，通常在出生後 18 個月。

不良反應：煩躁不安、易怒、異常哭鬧。嗜睡、嘔吐、發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 。注射部位反應（疼痛、紅疹、腫脹）等。

注意事項：

- 1、本疫苗**不適用於**滿 7 歲以上兒童。
- 2、疫苗**不可**經由靜脈途徑注射：應確保針頭不會刺入血管。**不可**使用皮內注射。若接種者有血小板減少症或出血性疾病，則接種 Pentaxim 時應小心，因為以肌肉注射方式接種疫苗後有可能發生出血的情況。
- 3、溶液的配製是將混合有白喉、破傷風、非細胞性百日咳及小兒麻痺疫苗的懸浮液注入裝有 b 型嗜血桿菌接合疫苗粉末的玻璃小瓶中而得。將其振搖至粉末完全溶解為止。經過配製後，**懸浮液的外觀呈現白色混濁是正常現象。**
- 4、疫苗經過配製後應立即使用。

懷 孕 期：無資料。Pentaxim 僅供未滿 7 歲兒童使用。

授 乳 期：無資料。Pentaxim 僅供未滿 7 歲兒童使用。

儲 存：儲存於冰箱（ 2°C - 8°C ）。不可冷凍。

備 註：公費品項。