

Diphtheria, tetanus toxoids, acellular pertussis, inactivated poliovirus combination vaccine

【I2DTAI】Tetraxim[®] suspension for injection

ATC Code : J07CA02

中文名： 巴斯德四合一疫苗 «SANOFI»

適應症： 適用於出生 2 個月至未滿 13 歲孩童的主動免疫接種，以預防白喉、破傷風、百日咳及小兒麻痺。

藥理分類： **Vaccine, Inactivated (Bacterial); Inactivated (Viral).**

用法用量： **Administration:** For IM use only.

- Preferably in the **deltoid**.
- Do not administer intradermally, IV, or SubQ.
- Shake well prior to use.

Dosage regimens :

- **基礎接種:** 由 2 個月大開始，共接種 3 劑，每劑至少間隔 1 個月。
- **追加接種:** 基礎接種之後 1 年追加注射 1 劑，通常在出生後 18 個月。
- **5~7 歲之間的追加接種 :** 1 劑。
- 於基礎接種及首次追加接種時，本疫苗可以與 b 型嗜血桿菌接合疫苗 (Act-HIB) 進行混合後一起接種，或與 b 型嗜血桿菌接合疫苗 (Act-HIB) 同時接種，但在兩個不同部位進行注射。
- 若兒童在 5-7 歲時沒有接種正常濃度(aP)的等價百日咳疫苗，則應於 7-13 歲時追加接種 1 劑。
- 衛生福利部疾病管制署建議青少年可考慮追加之百日咳疫苗為成人型減量百日咳疫苗。

不良反應： 注射部位反應(紅斑。疼痛。腫脹)。異常哭鬧、食慾減退及煩躁不安。失眠、睡眠障礙、嗜眠。頭痛。嘔吐、腹瀉。

注意事項：

1. 以肌肉注射方式接種。
2. **應先振搖**使之成為白色混濁的均勻懸浮液才能進行注射。
3. 最好注射在未滿 2 歲嬰幼兒的大腿前外側（中間三分之一範圍）及滿 2 歲兒童的上臂三角肌。
4. 不可經由靜脈途徑注射：應確保針頭不會刺入血管。不可使用皮內注射。
5. 本疫苗可與 M-M-RVAXPRO 疫苗(主成分: Measles, Mumps and Rubella)或 HBVAXPRO(主成分: Hepatitis B virus surface antigen)疫苗同時接種，但應注射在不同部位。
6. 本疫苗可以與 b 型嗜血桿菌接合疫苗 (Act-HIB) 一起或合併使用。
※若注射含有 b 型嗜血桿菌的疫苗後曾出現下肢水腫反應，則白喉-破傷風-百日咳-小兒麻痺疫苗，以及 b 型嗜血桿菌接合疫苗，這 2 種疫苗應分開在不同的兩天並於兩個不同部位進行注射。
7. 當有發燒或急症時，疫苗應延後接種。

懷 孕 期： 無資料。Tetraxim 限用於出生 2 個月至未滿 13 歲兒童。

授 乳 期： 無資料。Tetraxim 限用於出生 2 個月至未滿 13 歲兒童。

儲 存： 本劑須置於冰箱中（2-8 °C）。