

Hepatitis A Virus, Purified, Inactivated

【I2HEPA1】公費第1劑A型肝炎疫苗Avaxim® 80U Pediatric 80 U/0.5mL/Syrine ATC Code : J07BC02

【I2HEPA2】公費第2劑A型肝炎疫苗Avaxim® 80U Pediatric 80 U/0.5mL/Syrine

中文名： 巴斯德 A 型肝炎疫苗(兒童用) 《衛生所，裕利，賽諾菲》

適應症： 12 個月至 15 歲(含)兒童 A 型肝炎之主動免疫。

藥物性質： 不活化、吸附性。略帶白色的混濁懸劑。

用法用量： Administration:

- 本疫苗應以**肌肉注射**方式接種。建議接種部位為**三角肌**。
- 在特殊情況下，本疫苗可以**皮下注射**方式注射於患有血小板減少症或有出血風險的患者。
- 注射前先振搖成均質的懸浮液。

Dosage regimens:

Primary vaccination:

-只要注射一劑疫苗。每次接種的建議劑量為 0.5mL。

Booster vaccination:

- 為了提供長期的保護力，**建議在首次接種後 6-36 個月再追加注射一劑**。
- 健康人接種第 2 劑疫苗後所產生的 A 型肝炎病毒抗體能**持續超過 10 年**。

不良反應： 食慾下降、煩躁不安、失眠、頭痛、腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、關節痛、肌痛、注射部位的局部反應(如疼痛、發紅、水腫或硬塊、發燒、虛弱)。

注意事項：

- **供肌肉注射用**。不應注射於臀部，因這部位的脂肪組織量因人而異，可能導致疫苗療效之差異。
- 絕不可採行血管注射。不可以皮內注射方式接種。
- 在特殊情況下，可以皮下注射於患有血小板減少症或有出血風險的患者。
- 當有嚴重急性發燒病症、急症或慢性疾病惡化時，疫苗應延後接種。
- 免疫球蛋白與本疫苗可同時在**兩個不同部位**進行注射。本疫苗**不可**與其他疫苗在同一支注射器內混合注射。
- **注射前先振搖成均質的懸浮液**。

懷 孕 期： 懷孕期間最好避免接種本疫苗，除非有高度感染的風險。動物試驗並無相關的致畸性資料。懷孕期間接種 A 型肝炎，至今尚無足夠的資料可供評估。

授 乳 期： 不確定 A 型肝炎疫苗是否會分泌於乳汁，除非必要，授乳之母應避免在授乳期間接種 A 型肝炎疫苗。

儲 存： 儲存於冰箱(2°C - 8°C) 且應避免光照。不可冷凍。