

Measles, combinations with mumps & rubella, live attenuated

【IPRIO】自費 Priorix[®] 疫苗 (M-M-R II[®]) 0.5mL/Vial ATC Code : J07BD52

【I2MMR1】公費第 1 劑 Priorix[®]疫苗 (M-M-R II[®]) 0.5mL/Vial ATC Code : J07BD52

【I2MMR2】公費第 2 劑 Priorix[®]疫苗 (M-M-R II[®]) 0.5mL/Vial ATC Code : J07BD52

中文名：麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑 «GSK»

適應症：麻疹、腮腺炎及德國麻疹之主動免疫。

成分： Each dose contains:

Schwarz 株麻疹病毒..... $\geq 10^3$ TCID₅₀

腮腺炎 RIT 4385 株 $\geq 10^{3.7}$ TCID₅₀

Wistar RA 27/3 株德國麻疹病毒株 $\geq 10^3$ TCID₅₀

藥理分類： Vaccine; Vaccine, Live (Viral).

用法用量：

- Priorix[®] 是以皮下注射方式投予，雖然可採用在三角肌區域或在大腿的前外側區域之肌肉注射方式。
- 患有血液障礙者(如:血小板低下症或凝血障礙)，需皮下注射給藥。

不良反應： 上呼吸道感染、皮疹、發燒、注射部位泛紅。

交互作用： 可與減毒水痘疫苗 (Varilrix[®]) 同時接種 (分別注射在不同位置)。

注意事項：

1. 不可用於靜脈注射。
2. 應在配製完後儘可能立即予以注射，勿超過 8 小時。
3. 在年紀較小 (12 個月以內) 之嬰幼兒使用本疫苗，應該考慮在 12 個月大或 12 個月以後重新接種疫苗。
4. 禁用於對 Neomycin 產生全身性過敏症狀之患者；具有 Neomycin 所致接觸性皮膚炎病史則非本劑之禁忌症。
5. 接受一般肌肉注射免疫球蛋白治療或 B 型肝炎免疫球蛋白者，宜間隔 3 個月後再接種 Priorix[®]。
6. 輸過血或接受靜脈注射血液製品者，宜間隔 6 個月再接種 Priorix[®]。
7. 曾靜脈注射高劑量 ($\geq 1\text{g/kg}$) 免疫球蛋白治療時，宜間隔 11 個月後再接受 Priorix[®]。

懷 孕 期： 懷孕婦女不得使用 Priorix[®]。接種疫苗後 1 個月內應避免懷孕。

哺 乳 期： 有關授乳婦女使用情況的資料很少，當權衡其利益及風險。

儲 存： 於原包裝內避光貯存於 2°C 到 8°C 冰箱。溶劑可貯存在冰箱或室溫中。請勿冷凍凍晶疫苗或溶劑。