

Varicella Virus Vaccine

【I2VAR】Varivax® 0.5mL/Vial (公費)

ATC Code : J07BK01

中文名：伏痘敏活性水痘疫苗 «MSD»

適應症：水痘之主動免疫。

藥理分類：Vaccine, Live (Viral).

用法用量：Administration: SubQ: For SubQ injection only.

- Inject in the outer aspect of upper arm or the anterolateral thigh.
- Do not administer IV or IM.

Dosage regimens :

Children 12 mo-12 yrs: 0.5 mL × 1 dose.

Adults & Children > 13 yrs: ×2 doses (0.5 mL at 0 and 0.5 mL at 4-8 weeks).

不良反應：呼吸道疾病、咳嗽、不安/神經緊張、疲倦、不易入睡、腹瀉、沒有食慾、嘔吐、耳炎、接觸性發疹、頭痛、抑鬱、腹痛、噁心、眼部不適、發冷、淋巴腺腫脹、肌痛、過敏反應、頸部僵硬、粟粒疹/灼熱、關節痛、溼疹/皮膚乾燥/皮膚炎、便秘、搔癢。

注意事項：1. 本劑須皮下注射。不可直接注射於血管內。
2. 於稀釋後立即使用（稀釋後之安定性僅可維持 30 分鐘）。
3. 因酒精及其他之殺菌劑會使得本疫苗變成無效，於注射前應等其由皮膚消散後再施打。
4. 接種水痘疫苗後 6 週內不應使用 salicylates 製劑，以免增加發生 Reye's syndrome 之危險性。

懷孕 期：孕婦禁用，接種本劑後 3 個月內應避免懷孕。

授乳 期：目前尚不確知水痘疫苗病毒是否會分泌至乳汁，而由於已知有些病毒會進入人類乳汁，因此注射本疫苗的哺乳婦女必需特別注意。

儲 存：本劑須置於冰箱中（2-8 °C）避光儲存。