

## Iopamidol

【I3IOP】 Iopamiro 300 300mg Iodine/mL, 100mL/Bot *ATC Code : V08AB04*

中文名： 倍明影 300 注射液 « Bracco S.P.A.»

【I3IOP7】 Iopamiro 370 370mg Iodine/mL, 200mL/Bot *ATC Code : V08AB04*

中文名： 倍明影 370 注射液 « Bracco S.P.A.»

**適應症：** 神經造影術、血管造影術、尿路造影術。

**成分：** 本品為非離子性分子，水溶液具低滲透壓，化學毒性低。

IOPAMIRO 300 每毫升中含 Iopamidol-----612.4mg

IOPAMIRO 370 每毫升中含 Iopamidol-----755.3mg

**藥理分類：** Iodinated Contrast Media; Radiological/Contrast Media (Nonionic, Low Osmolality).

**用法用量：**

	濃度 (mg I/ml)	劑量 (ml)
神經造影術	200~300	5~15
脊髓脊神經根 X 光造影	200~300	5~15
腦池及腦室 X 光造影		
血管造影術	300	5~10(bolus)
腦動脈 X 光造影	370	8~15(bolus)
冠狀動脈 X 光造影	370	1.0~1.2 /Kg
胸部主動脈 X 光造影	370	1.0~1.2 /Kg
腹部主動脈 X 光造影	370	1.0~1.2 /Kg
心臟血管 X 光造影	300~370	depending on examination
選擇性內臟動脈 X 光造影	300~370	40~50
末梢動脈 X 光造影	300	30~50
靜脈 X 光造影		
尿路造影術	300~370	30~50

**不良反應：** 嘔吐、噁心、紅斑、全身性發熱、頭痛、鼻炎或喉水腫、發燒、發汗、虛弱、暈眩、蒼白、中度低血壓。

**交互作用：** 用於神經造影術時：

宜避免服用 Neuroleptics，因其會降低癲癇發作之閾值，並應避免服用 Phenothiazine 類鎮痛劑、止吐劑、抗組織胺及鎮靜劑。使用本品前至少 48 小時，應儘可能停止服用這些藥品，且於做完造影檢查後 12 小時以上，方能重新服用這些藥品。

用於血管造影術時：

正在進行心臟血管 X 光造影患者，須特別留意心臟右部及肺循環之情況，因為當注射有機碘溶液時，如有心臟右部機能不全，肺部高血壓，則可能會引起心跳徐緩及全身性低血壓。

**注意事項：**

1. 甲狀腺功能亢進患者，須專任醫師認為有確實需要時，方能使用含碘造影劑。若患者需要以放射性碘追蹤劑，做甲狀腺功能檢查時，應注意患者如果曾經使用，經由腎排出的含碘造影劑，會減少甲狀腺對碘的吸收天數。
2. 本品應避免強光照射。當有異常，有可能發生結晶。若顯示包裝有被破壞或受損的現象，則此產品不應該被使用。一旦打開，就必須要立即使用。
3. 任何殘留的造影劑應該被丟棄。Iopamiro 就像是其他含碘造影劑，應該避免直接接觸儀器上金屬表面包含銅 (如黃銅)。

**懷孕期：** Should be avoided unless absolutely required to obtain diagnostic information that will influence the care of the mother or fetus during pregnancy。

**哺乳期：** Caution be exercised when administering iopamidol to breastfeeding women.