

Ethiodized Oil (Iodine 38% w/w)

【I3LIP】Lipiodol Ultra-Fluide Iodine 38% w/w, 10mL/Amp *ATC Code : V08AD01*

中文名：淋皮道卵造影液 «Guerbet»

適應症：1. 放射診斷學：淋巴腺、子宮輸卵管造影。2. 介入放射學：於成人肝癌中期患者進行經導管動脈化學藥物栓塞治療(Trans-Arterial Chemo-Embolisation, TACE)時，幫助將病灶顯像及作為攜帶藥物的載具。3. 與外科黏膠水混合使用於血管栓塞術。

藥理分類：**Diagnostic Agent, Radiologic Examination of GI Tract.**

用法用量：10 毫升含碘量：4.8 公克

淋巴造影--

成人單側上肢：2~4mL

成人單側下肢：6~8mL

陰莖淋巴造影：2~3mL

頸部淋巴造影：1~2mL

兒童：1~6mL，不超過 0.25mL/kg

子宮輸卵軟管造影：以每次增加 2mL 方式

經導管動脈化學藥物栓塞治療：依腫瘤大小、肝臟及腫流血流供應而定。

與外科黏膠混合使用於血管栓塞術：醫病灶大小而定。

不良反應：噁心、腹瀉腹痛、發熱、血栓靜脈炎、過敏。

交互作用：Metformin：若用於動脈內投與，使用本品前後至少 48 小時內停用 metformin，待腎功能經評估恢復正常後才能使用。

注意事項：1. 對碘過敏及甲狀腺功能不良或肺機能不全的人，應特別小心。  
2. 瘻管注射時需極小心，以免穿刺到血管。  
3. 注射 Lipiodol U-F 與診察人員技術，照相部位不同，受檢查之身體狀況均有關，應謹慎多加注意。

懷孕期：不可用於孕婦。

哺乳期：哺乳期物使用本品。若需使用本品則需停止哺乳。