

Gadoxetic Acid

【I3PRI】 Primovist® 181.43mg/mL 10mL/Syringe

ATC Code : V08CA10

中文名： 卜邁維斯 «Bayer»

適應症： 適用於 T1 加權掃描核磁造影時，偵測肝臟局部病灶及提供病灶特性資訊。

活性成分： 組成：

每毫升的注射液含 0.25 毫莫耳 gadoxetate disodium
(相當於 181.43 毫克 gadoxetate disodium)。

藥理分類： Diagnostic Agent; Gadolinium-Containing Contrast Agent; Radiological/Contrast Media (Ionic, Low Osmolality).

用法用量： 用法： 限以靜脈注射給藥。以大約 2 毫升/秒的流速施打。本品使用後，靜脈留置針應用生理食鹽水沖洗。

用量： 每公斤體重注射 0.1 毫升本品(相當於每公斤體重 25 μmol gadoxetic acid)

配製方式：

- 本品為可馬上使用，不需稀釋的靜脈注射水溶液。
- 包裝開啟後須立即使用。
- 本品為可直接使用的注射溶液，僅供一次性使用。含顯影劑的小瓶不可多次抽取藥品。本品在使用前才能抽至注射針筒中。橡皮蓋只能穿刺一次。
- 單次檢查中未使用完的顯影劑應一律丟棄。

不良反應： 噁心、頭痛、感覺熱、血壓升高、頭昏。

注意事項：

1. 本品不應與其他藥品混合使用。
2. 應**嚴格避免**肌肉注射，因可能引起不良的局部反應，包括局部病灶的壞死。
3. 嚴重肝、腎功能受損的病患，應權衡利弊得失後再使用本品。
4. 含 gadolinium 的顯影劑曾有腎生性之全身性纖維病變(NSF)的案例發生。
5. ※本藥品使用於慢性嚴重腎臟疾病(GFR < 30mL/min/1.73m²)或急性腎損傷之病人，其發生 NSF 之風險達到最高。
※使用本藥品前應檢視病人腎臟功能情形，至少檢視病人 3 個月內之 serum creatinine 檢測結果，並評估病人是否有急性腎損傷或其他可能降低腎臟功能之情形(如大於 60 歲、高血壓、糖尿病)。

懷孕期： 孕婦給藥的潛在危險性尚屬未知。懷孕期間，本品僅可用於臨床上有需要之婦女。

哺乳期： 目前尚不知本品是否會分泌至乳汁中。在非臨床的試驗中顯示極少量的本品會進入母乳中(少於 0.5%的注射劑量)且經由胃腸道吸收的也很少(大約 0.4%的口服劑量被排泄至尿液中)。

貯存： 儲存於 30°C 以下。