

Meglumine Ioxitalamate

【I3TEL】Telebrix 30 Meglumine 300mg Iodine/mL 100mL/Bot ATC Code : V08AA04

中文名：拍立顯 30 注射液 «Guerbet»

適應症：末梢動脈、選擇性動脈、靜脈造影劑。

活性成分：組成：(an ionic iodinated contrast medium)

每 100 毫升

Meglumine Ioxitalamate .....66.03 克

相當於含碘 ..... 30 克

藥理分類：Diagnostic Agents, Ionic Iodinated contrast medium.

用法用量：1. 血管照相：視檢查種類而定。重複注射時不可超過 4-5ml/kg，每次注射不可超過 100mL。  
2. 尿道照相：成人-- 1 mL/kg,  
小孩-- 依年齡及體重而定  
3-20kg：1mL/kg + 6mL  
< 3kg：3mL/kg

不良反應：對熱敏感(尤其在喉部及腹骨盆腔)、臉潮紅、噁心及嘔吐。

禁忌：不可用於骨髓 X 光攝影。

注意事項：1.有嚴重肝衰竭，充血性心臟衰竭，嚴重呼吸道衰竭，或對碘過敏之患者應特別小心。  
2.進行檢查應避免脫水，尤其是腎衰竭、糖尿病、骨髓瘤、高尿酸血症及嬰兒與有動脈瘤的老人應保持充足尿量狀態。  
3.對造影劑之不良反應有特別危險的患者(過敏或對碘過敏之病患)，可是先給予藥物預防。