

## Iodixanol

【I3VIS】 Visipaque® 320mg Iodine/mL, 100mL/Bot *ATC Code : V08AB09*

中文名： 易渠派克注射劑 «奇異»

適應症： X光對比劑：用於心臟血管、腦血管、周邊動脈造影、腹腔動脈造影、泌尿道造影、靜脈造影、電腦斷層影像加強。腰椎、胸椎及頸椎之脊髓造影。

藥理分類： **Iodinated Contrast Media**; Radiological/Contrast Media (**Nonionic**, Iso-osmolality).

用法用量： **Adult:** Maximum recommended total dose of iodine: 80 g

Intra-arterial: Iodixanol 320 mg iodine/mL: Dose individualized based on injection site and study type; refer to product labeling

IV: Iodixanol 270 mg and 320 mg iodine /mL: concentration and dose vary based on study type; refer to product labeling.

**Pediatric:** Maximum recommended total dose of iodine: Not been established

Cerebral, cardiac chambers, and related major arteries and visceral studies: Intra-arterial:

Children > 1 year: Iodixanol 320 mg iodine/mL: 1-2 mL/kg; maximum dose: 4 mL/kg

Contrast-enhanced computer tomography or excretory urography: IV:

Children > 1 year: Iodixanol 270 mg iodine /mL: 1-2 mL/kg; maximum dose: 2 mL/kg

不良反應： 熱感、末梢疼痛、腹部不適。

注意事項： 1.病人在接受造影劑前後應給予適當水分。  
2.嚴重心臟疾病及費高壓病人應特別小心。  
3.正使用 metformin 患者：(1)腎功能正常者，接受造影劑當天及接下來 48 小時需要停用 metformin，待腎功能/肌酸酐恢復後，才繼續使用。(2)腎功能不佳者，使用後待接受造影劑前 48 小時急需停 metformin，待腎功能/肌酸酐穩定後，才繼續使用。

懷 孕 期： 1. 除非臨床情況必須使用 Gadoteric acid，否則不應使用於懷孕婦女。  
2.使用 Visipaque®於孕婦的安全性上待建立。動物試驗無直接或間接證據顯示有生殖毒性。

授 乳 期： 使用 Visipaque®前後 24 小時內不要哺乳。Iodixanol 分泌至乳汁的量經推測應不高，但仍不確定。

儲 存： 低於 30 °C 避光貯存，玻璃瓶裝可於使用前 37 °C 存放一個月。