

Lobitridol

【I3XEN】Xenetix 300 Inj Solution 300mg Iodine/mL, 100mL/Bot ATC Code : V08AB11

中文名： 易立顯 300 注射液 «Guerbet»

適應症： 用於成人及小孩之：—靜脈內尿路攝影。—腦部及全身電腦斷層掃描。—靜脈的數位消滅血管攝影。—動脈攝影。—心血管攝影檢查。(作用：電腦斷層、尿路、血管攝影顯影劑。)

主要成分： 每 100 毫升溶液

Lobitridol 65.81 克 (658.1 毫克/毫升)

相當於含碘 30 克 (300 毫克/毫升)

藥理分類： Diagnostic Agents.

用法用量： 使用劑量須配合檢驗方式，檢驗部位與受檢驗者的體重與腎功能，尤其是使用於兒童的檢驗時須特別注意。

建議劑量如下：

適應症	平均劑量 (毫升/公斤)	總量 (最小值/最大值)毫升
尿路攝影		
-快速注射	1.2	50-100
-慢速注射	1.6	100
腦部電腦斷層掃描	1.4	20-100
全身電腦斷層掃描	1.9	20-150
靜脈內數位消滅血管攝影	1.7	40-270
腦動脈攝影	1.8	45-210
下肢動脈攝影	2.8	85-300
心血管攝影檢查	1.1	70-125

不良反應： 注射部位疼痛、味覺不良、過敏、溫熱感、噁心、嘔吐、潮紅。

注意事項： 投與含碘造影劑後，應監測病人至少 30 分鐘，因為多數嚴重副作用發生於此時間內，應告知病人副作用可能會延遲至檢查後 7 天出現。

懷孕期： 可能引發胎兒甲狀腺功能異常。然而在此作用為可逆且如果單獨注射含碘造影劑對懷孕母親的檢查有益並經過小心評估後，則可在經上述考量下投於孕婦。

哺乳期： 含碘造影劑僅少量分泌於母乳中。單獨對母親給藥後對嬰兒有輕微的風險，因此建議注射含碘造影劑後停止哺乳 24 小時。