

Thyrotropin Alfa

【I7039】 Thyrogen 1.1mg/Vial

ATC Code : H01AB01

中文名： 適諾進凍晶注射劑 1.1 毫克 «Sanofi»

適應症： 1. 甲狀腺分化癌治療之輔助診斷製劑。2. 適用於因甲狀腺分化癌而接受幾乎全部或全部甲狀腺切除、且沒有轉移性甲狀腺癌的跡象的病人，THYROGEN (thyrotropin alfa for injection) 可用來作為甲狀腺殘留組織的放射碘去除之輔助療劑。

藥理分類： Diagnostic Agent

用法用量： 建議使用兩次注射給藥法給予 THYROGEN：

THYROGEN 的建議劑量為臀部肌肉注射 0.9 mg，24 小時後再給予第二次臀部肌肉注射 0.9 mg。

THYROGEN 只能肌肉注射，不可用靜脈注射給藥。

藥物配製

1. 將 1.2 mL 的無菌注射用水加入注射瓶中。轉動注射瓶直到內容物溶解，不要搖晃溶液，配製後的溶液濃度為 0.9 mg/mL。
2. 配製後的溶液若無冷藏，則必須在 3 小時內 完成注射，若有冷藏，最多可放置 24 小時。

不良反應： 噁心及頭痛、類流感症狀、注射部位反應(包括疼痛、紅疹、瘀青和搔癢)。

注意事項：

1. 本藥限以肌肉注射方式施打，絕對不可用靜脈給藥。
2. 本藥的療程為兩次劑量間隔 24 小時。
3. 鼓勵病人在開始用本藥治療前要補充足夠水分。

懷孕期： THYROGEN 未曾作過動物生殖性試驗。未知孕婦使用本藥是否會傷害胎兒或影響生育能力。孕婦只有在確實必要下，才能使用本藥。

授乳期： 並不清楚本品是否會分泌至乳汁中。由於很多藥品均會分泌至乳汁中，因此授乳中的病人使用 THYROGEN 應特別小心。