

Paclitaxel

【I7040】 Abraxane® for Inj Suspension 100mg/Vial

ATC Code : L01CD01

中文名：亞伯杉注射劑 «賽基有限公司»

適應症：轉移性乳癌。非小細胞肺癌。轉移性胰腺癌。

藥理分類：Antineoplastic Agent, Antimicrotubular; Taxane Derivative.

用法用量：轉移性乳癌：

對於轉移性乳癌以合併化療失敗，每3週一次，以30分鐘靜脈射 260mg/m²。

非小細胞肺癌：

每21天療程的第1、8、15天，以30分鐘靜脈輸注 100 mg/m²。Carboplatin

僅在每21天療程的第1天施用 Abraxane®之後立即開始。說明：在

Abraxane®用於非小細胞肺癌之臨床試驗中，Carboplatin 之目標劑量為每次 AUC = 6 mg•min/mL。

胰腺癌：

Abraxane®之建議劑量為每28天療程的第1、8、15天，以30-40分鐘靜脈輸

注 125 mg/m²。Gemcitabine 之建議劑量為 1000 mg/m²，在每28天療程的第

1、8、15天，施用 Abraxane®之後立即開始以 30-40 分鐘靜脈輸注。

不良反應：嗜中性白血球缺乏症、血小板缺乏、貧血、過敏反應、體液滯留、皮膚反應、感覺異常、禿頭、肝指數異常、注射部位反應。噁心、嘔吐、腹瀉。

注意事項：

1. Neutrophil 數目小於 1500 個/mm³、懷孕及授乳婦禁用此藥。
2. 外滲時處理：冷敷或熱敷。
3. 本品為 Paclitaxel 結合白蛋白之劑型，其藥物功能性質可能與溶液劑型有大幅差異。請勿交替使用不同 Paclitaxel 劑型。

懷孕期：1.懷孕女性使用 Paclitaxel 可能會導致胎兒傷害。

2.目前尚未針對懷孕女性進行試驗。應指示具有懷孕能力的女性在 Paclitaxel 治療期間避免懷孕。如果在懷孕期間使用 Paclitaxel，或患者在接受該藥物治療時懷孕，應評估患者的潛在危險。

授乳期：考慮用藥對母體的重要性，決定停止哺乳或停止用藥。還不清楚 Paclitaxel 是否會分泌至人類乳汁中。

配製：以 20mL NS 溶解後（5mg/mL），以針筒抽取所需劑量，移至空輸液袋。

安定性：調製後之溶液可冷藏 24 小時，在室溫下可儲存 4 小時。

儲存：藥瓶應置於原包裝紙盒，避免強光照射，存放在 30°C 下。

給付規定：全民健保給付規定：Paclitaxel 成分注射劑限用於

9.5.2.Albumin-based paclitaxel（如 Abraxane）：(108/11/1)

限併用 gemcitabine，做為轉移性胰腺癌患者之第一線治療。