

Streptococcus pyogenes Su strain+ Penicillin G Potassium

【I7043】 Picibanil 5KE® 5KE/Vial

ATC Code : L01XX

中文名：必醫你舒 5KE 注射劑 «台灣中外»

適應症：治療消化器癌、頭頸部癌、甲狀腺癌、肺癌。

藥理分類：Antineoplastic Agent.

用法用量：Administration & Dosage regimens：

1. 靜脈注射：

- 用量：初期劑量為每星期 2~3 次，每次 0.2~1 KE，隨時注意病人之狀況而酌量增減。欲增量時，宜做階梯式漸增法。維持量為每星期 2~3 次，每次 1~3KE。
- 用法：以 2 mL 生理食鹽水或 5% 葡萄糖液稀釋溶解，做靜脈內注射，或與相容輸注液混合而做靜脈點滴。

2. 局部用法：

- 通常將 1 次量 5-10 KE 以 2 mL 生理食鹽水稀釋溶解，每日或數日 1 次注入腫瘍內或腫瘍邊緣。

3. 漿膜腔內用法：

- 通常將 1 次量 5-10 KE 以 2 mL 生理食鹽水稀釋溶解，每星期 2~3 次投與漿膜腔內。

4. 肌肉內與皮下投藥法：

- 用量：初次劑量由 0.2~0.5 KE 開始，每日或隔日 1 次，並隨時觀察病人之狀態，每 3~5 次後以階梯式逐漸增量，維持量為每次 1~5KE，每週 1~3 次。
- 用法：以 2 mL 生理食鹽水適當地稀釋溶解，做肌肉與皮下注射。
- 肌肉內或皮下投藥時，注射部位有時會出現疼痛、發紅、硬塊，應避免反覆注射在同一部位。注意避開神經分佈部位。

Note：同一天內對於同一病人不得進行 2 種以上途徑之投藥。

不良反應：發燒，注射部位反應(疼痛、發紅、硬塊、腫脹)，全身倦怠、食慾不振。

注意事項：

1. 本品為凍晶乾燥粉末。
2. 患有心臟、腎臟疾病的病人應謹慎投與(動物之毒性實驗顯示，長期大量使用時會引起類似溶血性鏈球菌感染症的現象(例如心障礙、腎障礙、澱粉樣變性病等))。
3. 曾對 Cephem 類抗生素發生過敏的病人應謹慎投與。
4. 對青黴素類抗生素有過敏病史的病人(本品含有苯甲基青黴素)不建議使用。
5. 溶解後的注射液須儘速使用。
6. 保存在 10°C 以下，避免冷凍。

懷 孕 期：對於孕婦或有可能已懷孕的婦女，必須只有在治療上判斷其有益性超過危險性時才可投與。(目前關於懷孕時的用藥安全性尚未確定)

授 乳 期：除非必要，否則授乳期間不可使用。

相容輸注液：NS、D5W。