

Propacetamol HCl

【IACE】自費 Acetamol Injection 1g“Standard” 1g/Vial

ATC Code : N02BE05

中文名： “生達” 舒疼消熱注射劑 1 公克 《生達》

適應症： 在無法使用口服投藥方式時，用於疼痛或發燒之症狀治療。

成分： 每劑含：

1. 藥品粉末：

Propacetamol HCl 1 g

(eq. to Paracetamol 0.5 g)

※ Propacetamol is a prodrug form of paracetamol

2. 溶劑(5mL)

Sod. citrate 100 mg

藥理分類： Analgesic, Nonopioid; Antipyretic.

用法用量：

用法：直接靜脈注射(2 分鐘)或靜脈輸注(15 分鐘)

用量：

成人：

- 1-2 公克。必要時可於 4 小時以後再給予。
- 每日不要超過 6 公克，即使有特殊狀況也不要超過 8 公克。

孩童：

- 每次每公斤注射 30 毫克，至少需間隔 6 小時後才可以再注射。
- 每日每公斤不可超過 120 毫克 Propacetamol，即 60 毫克 Paracetamol。

不良反應： 胃腸不適、噁心、嘔吐、頭暈。

交互作用：

1. ISONIAZID: ↑ risk of hepatotoxicity.
2. PNEUMOCOCCAL 13-valent vaccine, DIPHTHERIA conjugate: may result in an inadequate immunologic response to the vaccine.
3. CARBAMAZEPINE: ↑ risk of acetaminophen hepatotoxicity and ↓ acetaminophen exposure.
4. IMATINIB: ↑ acetaminophen levels.

注意事項： 1. 患有肝臟功能障礙之病患不建議用本劑。
2. 正接受抗凝血藥物治療者不建議用本劑。

懷 孕 期： 1. 在懷孕的首三個月不建議使用。
2. Paracetamol 會通過胎盤。
3. 若需使用，應以最低有效劑量，短期使用。

授 乳 期： 少量的 Paracetamol 可以分泌至乳汁。在一般使用劑量下，哺乳婦可以使用。

調製與安定性： 1. (1)以隨附 5mL 之溶劑調製。(2)調製後，輸注液可使用生理食鹽水、葡萄糖液。(3)直接靜脈注射(2 分鐘)或靜脈輸注(15 分鐘)。
2. 本品配製後須在 30 分鐘內使用，以免影響品質。
3. 不要與其他藥物混合使用。

儲 存： 25°C 以下。