

Mixtures of Trace Elements

【IADD】Addaven® Concentrate Injection 10mL/Bot

ATC Code : B05XA31

中文名：微達穩注射液 «費森尤斯卡比, Fresenius Kabi»

適應症：本劑須混入 TPN 溶液中，供施打 TPN 的病人使用，維持血漿中微量元素的含量，防止因體內貯存微量元素不足時之病症（微量元素補充劑）。

成分：Each mL contains: 1 mL 的有效成分等同於：

Zinc (as Chloride)	1.05 mg	Zn: 500 µg
Ferric (as Chloride Hexahydrate)	540 mcg	Fe: 110 µg
Manganese (as Chloride)	19.8 mcg	Mn: 5.5 µg
Sodium (as Selenite)	17.3 mcg	Na: 120 µg
Chromic (as Chloride)	5.33 mcg	Cr: 1.0 µg
Copper (as chloride dihydrate)	0.1023 mg	Cu: 38 µg

藥理分類：Trace Element, Parenteral.

用法用量：**IV Infusion only:**

Adults:

The recommended daily dosage of Addaven in adult patients with basal to moderately

Increased requirements is 10 mL (one ampoule)

Children > 15 kg:

0.1 mL/kg/Day

不良反應：噁心、嘔吐、寒顫、發熱、頭痛。過敏。

注意事項：1.全膽管阻塞、威爾森氏症 (Wilson's disease), 血鐵沉著症(hemochromatosis)的病患不建議使用。

2.不建議使用於小於 15 公斤的兒童。

3.本劑不可直接末梢靜脈注射，須經稀釋後方可使用。

4.本劑使用於 TPN 時，須先衡量病患之微量元素代謝需求以及疾病狀況。

5.病人若同時口服鐵補充劑需計算鐵補充量以免過量。

懷 孕 期：未進行 Addaven®的動物生殖研究或懷孕期間的臨床檢測。懷孕女性的微量元素需求會稍微高於非懷孕女性。懷孕期間使用 Addaven®預計不會造成不良事件。

授 乳 期：Addaven®的有效成分會分泌至人類乳汁內，經證實接受治療女性對新生兒/嬰兒授乳會造成影響。這些為可接受的預期影響。

安 定 性：

● 本品經稀釋後，在 25°C 下的使用中物理、化學安定性為 24 小時。

● 基於微生物學的觀點，本產品應立即使用。若未立即使用，一般在 2 - 8°C 時不得超過 24 小時。

滲 透 壓：約 3100 mosm/kg 水 (約等於 2500 mosm/L 水)。
(Osmolality)