

L-Isoleucine etc.(14 Amino acids)

【IAMIO】(自費) Aminogen-X[®] injection 250mL/Bag

ATC Code : B05BA10

中文名：安命活源注射液 «南光化學»

適應症：電解質失調、維他命缺乏、蛋白質缺乏等營養不良症狀。

藥理分類：Caloric Agents

成分：

	mg/mL	gm/L	m. mol/L	Cal./L
Total Calorie	-	-	-	300
Essential Amino Acid				
L-Isoleucine	0.8	0.8	-	3.2
L-Leucine	1.1	1.1	-	4.4
L-Lysine HCl	1.25	1.25	-	4.0
L-Methionine	1.05	1.05	-	4.2
L-Phenylalanine	1.1	1.1	-	4.4
L-Threonine	0.5	0.5	-	2.0
L-Tryptophan	0.25	0.25	-	1.0
L-Valine	0.75	0.75	-	3.0
Non-Essential Amino Acid				
L-Arginine	2.0	2.0	-	8.0
L-Histidine	0.5	0.5	-	2.0
Glycine	5.0	5.0	-	20.0
L-Alanine	3.0	3.0	-	12.0
L-Glutamic acid	4.5	4.5	-	18.0
L-Proline	3.5	3.5	-	14.0
Electrolyte				
Na ⁺ (Sodium hydroxide)	1.6	1.6	40	-
K ⁺ (Potassium hydroxide)	1.68	1.68	30	-
Mg ⁺⁺	1.07	1.07	5	-
Acetate			10	-
Malic acid	3.0	3.0	22.5	-
Cl ⁻ (Lysine HCl + Pyridoxine HCl)			7	-
Vitamins				
Ascorbic acid (Vit. C)	0.4	0.4	-	-
Riboflavin Sodium Phosphate	0.0025	0.0025	-	-
Inositol	0.5	0.5	-	-
Nicotinamide	0.06	0.06	-	-
Pyridoxine HCl	0.04	0.04	-	-
Sorbitol	25	25	-	100
Xylitol	25	25	-	100

用法用量：

Administration:

- 本品應由靜脈輸注給藥。
- 使用附有過濾器的輸液裝置給藥。
- 靜脈輸注時速度宜緩慢，每小時以 250mL 為宜。

Dosage regimens:

通常成人每日以 1000mL 為宜，必要時可增至 2000mL。

不良反應： 暈眩、頭痛、噁心、嘔吐、胸部不適感。

禁 忌： 患有嚴重肝性實質損壞、腎病性循環不良、血氮過高者不適用。

注意事項：

- 使用前才自包裝取出。
- 使用前必須檢視輸注液是否澄清、無雜質。

懷 孕 期： 無相關數據。

授 乳 期： 無相關數據。

儲 存： 儲存於 25°C 以下。