

【IAMO】 Amoclav® 1.2g/Vial

ATC Code : J01CR02

中文名：艾莫斯克靜脈乾粉注射劑 «中化裕民»

成分： Each vial contains:

Amoxicillin ..... 1 g  
Clavulanic Acid ..... 0.2 g

藥理分類： **Antibiotic, Penicillin; Clavulanic acid: Beta-lactamases Inhibitor.**

適應症：對 Amoxicillin\_ Clavulanic Acid 具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量： **Note:** Dosage strengths based on **amoxicillin** component.

Treatment should not be extended beyond 14 days without review.

**Administration:**

- **IV injection** (3-4 minutes) or
- **IV intermittent infusion** (over 30-40 minutes).
- It is not suitable for IM administration.

**Dosage regimens: Dose is based on amoxicillin.**

— Adults and children over 12 years of age:

Usually 1 g Q8H. Serious infections 1g Q6H.

— Children 3 months to 12 years of age:

Usually 25 mg/kg Q8H. Serious infections: 25 mg/kg Q6H.

— Children 0-3 months of age:

25 mg/kg every 12 hours during the perinatal period, increasing to 8 hours thereafter.

**Dosing: Kidney Impairment in Adult. Dose is based on amoxicillin.**

- CrCl  $\geq 30$  mL/minute: No dosage adjustment necessary.
- CrCl 10 to  $< 30$  mL/minute: 250 to 500 mg every 12 hours.
- CrCl  $< 10$  mL/minute: 250 to 500 mg every 12 to 24 hours.

腎功能缺損者的劑量： 成人：(dose based on amoxicillin\_ Clavulanic Acid)

輕度缺損 (肌酸酐廓清率 $> 30$ ml/min)	中度缺損 (肌酸酐廓清率 $10 \sim 30$ ml/min)	嚴重缺損 (肌酸酐廓清率 $< 10$ ml/min)
無須改變劑量	先靜脈注射一劑 1.2 克，然後再每 12 小時靜脈注射 600 毫克	<ul style="list-style-type: none"><li>● 先靜脈注射一劑 1.2 克，然後再每 24 小時靜脈注射 600 毫克。</li><li>● 由於洗腎會降低 AmoClav 的血中濃度，因此可能必須於洗腎期間與洗腎終了額外靜脈注射一劑 600 毫克的劑量。</li></ul>

不良反應：腹瀉(最常見)、消化不良、噁心、嘔吐、紅斑疹、蕁麻疹等。

- 注意事項：
1. 肝功能不全病人需小心使用。
  2. 腎臟功能不全病人需調整劑量。
  3. 本品含鈉及鉀，須注意血液電解質。
  4. AmoClav 靜脈注射劑可以靜脈注射或間歇輸注的方式給藥；但不適用於肌肉注射給藥。
  5. 應注意與其它  $\beta$  內醯胺類抗生素 (如 cephalosporins) 發生交叉敏感性的可能性。

懷孕期：除非醫師認為有必要，否則應避免於懷孕期間使用，特別是在懷孕的最初三個月期間。

授乳期：AmoClav 或可在授乳期間使用。雖然會有微量的藥物出現在乳汁，但除了會有感受度升高的危險之外，對以母乳餵哺的嬰兒並無任何不良的影響。

配製：1. 每一瓶先用 20ml 注射用水稀釋。泡製後 20 分鐘內，以 3~4 分鐘速率緩慢靜脈注射。或

- 2.立即以相容輸注液 100mL 進一步稀釋後，以靜脈輸注 30~40 分鐘。應於稀釋後四小時內完成。
- 3.泡製期間可能會出現暫時性的粉紅色澤。泡製後的溶液通常呈現一種淡淡的稻草顏色。泡製後的溶液不可冷凍。

**相容輸注液：** 注射用水、氯化鈉靜脈注射液。

- 安 定 性：**
1. 本品在含有葡萄糖、聚葡萄糖或重碳酸鹽的輸注液中較不穩定。配製後的溶液不可加入這類輸注液中，但或可以 3-4 分鐘的時間緩慢注入滴管中。
  2. 配製後，室溫保存 4 小時，2-8 °C 保存 8 小時。