

## Lysine Acetylsalicylate

【IASPLM】Aspegic IM (Lyacety<sup>®</sup>) 500 mg/Vial

ATC Code : N02BA01

【IASPLV】Aspegic IV (Lyacety<sup>®</sup>) 500 mg/Vial

ATC Code : N02BA01

中文名：解你疼乾粉注射劑 «中化»

適應症：解熱、鎮痛、風濕性關節炎。

成分： Each vial contains:

Lysine Acetylsalicylate ..... 0.9 g  
(eq. to Acetylsalicylic Acid ..... 0.5 g)  
Glycine ..... 0.1 g

藥理分類： **Salicylates.**

用法用量： IM or IV

Adults, 0.5-2 g (acetylsalicylic acid)/day,  
MAX 4 g (acetylsalicylic acid)/day.

不良反應： 胃腸不適、噁心、嘔吐、胃粘膜受損、潰瘍及隱發性血液流失現象等。

交互作用：

- **Varicella Virus-Containing Vaccines** : ↑ the adverse/toxic effect of Varicella Virus-Containing Vaccines. ↑ the risk for Reye's syndrome.
- **Vaccines**: ↓ the therapeutic effect of Vaccines. Only applies to prophylactic use of NSAIDs before or during vaccine administration.
- **Urokinase**: ↑ the anticoagulant effect of Urokinase.
- **Apixaban, Dabigatran, Edoxaban, Rivaroxaban, Aspirin** : ↑ risk of bleeding.
- **Enoxaparin, Heparin**: ↑ the anticoagulant effect of Enoxaparin.
- **Sulfinpyrazone**: ↓ the serum concentration of Sulfinpyrazone.

注意事項： 患有消化性潰瘍、出血症之病患禁用本劑。

懷 孕 期： 1.在懷孕的首三個月以 aspirin 作短期治療，似乎沒有特別的致畸性。Aspirin 的長期治療：在懷孕的首三個月，以每日高於 150mg 的 aspirin 作長期治療，尚未有足夠的數據可用以評估其任何的致畸性。  
2.在懷孕的首五個月—必要時，可以給予短期的 aspirin 治療，為了安全起見，不建議以高於每日 150mg 的 aspirin 作長期治療。  
3.自懷孕的第六個月起—除了極少數心血管或產科在特別的監督下使用外，自懷孕的第六個月起，**禁用**任何含有 aspirin 的藥物。

授 乳 期： Aspirin 可以通過乳汁，因此不建議用藥時哺育母乳。

調製與安定性： 1.(1)以滅菌蒸餾水 5mL 調製。(2)調製後，輸注液可使用生理食鹽水、葡萄糖液。(3)直接靜脈注射或靜脈輸注。  
2.本品配製後須在 30 分鐘內使用，以免影響品質。