

Ibandronate Sodium

【IBONV】 Bonviva® 3mg/3mL/Pre-filled Syringe ATC Code : M05BA06

中文名： 骨維壯注射劑 «Roche»

適應症： 用於治療停經後婦女之骨質疏鬆症 (BMD-T score < -2.5 SD) 以減少脊椎骨骨折。

藥理分類： Bisphosphonate Derivative

用法用量： Safety and efficacy not established in children. Not indicated for use in children.

Administration:

Administer as a 15 to 30 second bolus IV; avoid paravenous or intraarterial administration (may cause tissue damage). Do not mix with calcium-containing solutions or other drugs. For osteoporosis, do not administer more frequently than every 3 months.

Indications and dosage regimen:

Postmenopausal Osteoporosis:

3 mg IV over a period of 15-30 seconds once every 3 months.

Special Populations:

— Hepatic Impairment & Geriatric Patients:

Dosage adjustments not necessary.

— Renal Impairment:

Note: Should not be administered to patients with severe renal impairment (Clcr < 30 mL/min, Scr > 2.3 mg/dL).

禁忌： 未經矯正的低血鈣症。

不良反應： 流行性感冒樣症狀、關節痛、背痛、消化不良、高血壓及可能導致暫時性的血鈣值降低等。

注意事項： 1. 僅可靜脈注射投予。以 15 至 30 秒的時間靜脈注射 3 毫克。
2. Bonviva® 注射劑不可與含鈣溶液或其它靜脈注射藥混合使用。
3. Bonviva® 注射劑的施打頻率切勿超過每 3 個月一次。
4. 如果漏打一劑 Bonviva® 注射劑，應儘快重新安排時間補行注射，然後再從最後一次注射之日算起，排定每 3 個月施打一次的時間。
5. 接受本劑治療的患者必須補充鈣質與維他命 D。

懷孕期： 目前並無任何適當且控制良好的孕婦研究。只有在潛在效益超越母親與胎兒可能面臨之風險的情況下，才可於懷孕期間使用 Bonviva® 注射劑。

授乳期： 目前尚未確知 Bonviva® 是否會分泌至人類乳汁中，對授乳婦投與 Bonviva® 應多加小心。

給付規定： 限同時符合下列規定：

- 1、停經後婦女因骨質疏鬆症(BMD-T score < -2.5 SD)引起之脊椎壓迫性骨折(需於病歷詳載)。
- 2、serum creatinine 小於或等於 2.3mg/dL 的患者。
- 3、不得併用 calcitonin、raloxifene 及活性維生素 D3 等藥。