

Boostrix

【IBOOS】Boostrix® 0.5 mL/Syringe

ATC Code : J07CA

中文名：補施追疫苗 «GSK»

主成分： Each Syringe contains:
Diphtheria toxoid.....≥ 2 IU
Pertussis toxoid(PT)..... 8 mcg
Tetanus Toxoid.....≥ 20 IU

適應症：適用於四歲以上者之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風及百日咳。

藥理分類： Vaccine, Inactivated (Bacterial).

用法用量： Boostrix® is administered as a single 0.5-mL intramuscular injection into the deltoid muscle of the upper arm.

不良反應： 注射部位紅、腫、痛。

注意事項： 在3天內請留意可能發生的高燒（40°C）、虛脫及痙攣等不良反應；若有發生請回診就醫。

懷孕期： 1. 只有在確定有此必要，且其潛在效益超越對胎兒的潛在危險時，才可在懷孕期間使用 Boostrix®。
2. 動物研究並未發現本品會對懷孕、胚胎/胎兒發育、生產或出生後發育造成任何直接或間接的有害影響。與其他的去活性疫苗一樣，並不認為會對胎兒造成傷害。

授乳期： 目前尚未評估在授乳期間使用 Boostrix®的安全性。目前不清楚 Boostrix®是否會分泌至人類母乳中。只有當潛在效益大於潛在危險時，才可在授乳期間使用 Boostrix®。

備註：本品項可用於孕婦，預防新生兒感染百日咳。