

Zefotam (Cefoperazone Sodium, Sulbactam Sodium)

【IBRO3】 Zefotam® 1 g/Vial

ATC Code : J01DD62

中文名： 賜復坦乾粉靜脈注射劑 《中國化學》

適應症： 適用於治療由感受性細菌所引起的下列感染：上、下呼吸道感染、上、下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其它腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其它生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。

成分： Each vial contains:
Cefoperazone Sodium 500 mg
Sulbactam Sodium 500 mg

藥理分類： Antibiotic, Cephalosporin, Third Generation; sulbactam, a beta-lactamase inhibitor.

用法用量： **Administration:** IV injection: over at least 3 min. IV infusion over 15-60 minutes.

Indications and dosage regimen:

Infectious disease of abdomen, neutropenia associated with infectious disease, postoperative wound infection, urinary tract infectious disease :

Adult:

Mild-to-moderate infections: 0.5g/0.5g ~ 1g/1g Q12h.

Severe infections may be treated with a maximum of 2 g / 2 g Q12 h.

Patients with both hepatic and renal dysfunction will likely require dosage reduction.

Children:

Mild-to-moderate infections: 20mg/20mg/kg/day ~ 40mg/40mg/kg/day in 2-4 divided doses ; Serious infections: 80mg/80 mg/kg/day in 2-4 divided doses.

Renal Impairment:

Clcr(mL/min)	Cefoperazone/Sulbactam Max Dose
30	4g/4g (2g/2g Q12h)
15-29	2g/2g (1g/1g Q12h)
≤15	1g/1g (500mg/500mg Q12h)

不良反應： 胃腸不適、發疹、發燒、肝酵素上升、維他命 K 缺乏症。

注意事項： 1.下列患者慎用：肝功能不全、腎功能不全、經口攝食不良、缺乏維他命 K 而有出血症狀、老人。

2.只限靜脈給藥，不可皮下及肌肉注射。靜脈注射應不少於 3 分鐘。靜脈輸注時間應超過 15-60 分鐘。以 NS 或 D5W 為輸注液。

懷 孕 期： 因有安全性的考量，對孕婦或者有可能懷孕的婦女，只有在治療上判斷好處優於危險性才可以注射。

授 乳 期： 因有能會分泌到母乳，因此正在哺乳婦女於注射時請停止哺乳。

配 製： 1.每瓶加入 6-10ml 稀釋液，振搖至溶解。
2.若使用靜脈輸注給藥，請於充分溶解後加入可配伍之靜脈輸注稀釋液使用。

相容輸注液： D5W，NS。

安 定 性： 配製後溶液於室溫可保存 6 小時或冷藏保存 48 小時。