

Cefmetazole

【ICETA】Cetazone® 1g/Vial

ATC Code : J01DC09

中文名：喜達隆注射劑 «信東»

適應症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染。

藥理分類：Antibiotic, Cephalosporin (Second Generation).

用法用量：Administration: IV over 3-5 minutes or intermittent IV infusion over 10-60 minutes.

Usual dosages:

Adults: 1-4 g/day in 2-4 doses.

Children: 25-150 mg/kg/day in 2-4 doses.

MAX 150 mg/kg/day

Recommended dosages in adults with renal impairment:

Clcr (mL/min)	Dosage
50-90	1-2 g Q12h
30-49	1-2 g Q16h
10-29	1-2 g Q24h
<10	1-2 g Q48h; give dose after hemodialysis

禁忌：對於本劑成分或 cephem 系抗生物質有過敏症之既往病史的患者，原則上不可投與，但必要時請慎重投與。

注射液配製：1. 每一小瓶以 10mL 注射用水、NS 或 D5W 溶解後，緩慢 IV 注射。
2. 若由靜脈滴注投與則須選用 100mL 之 NS 或 D5W 稀釋。

不良反應：GOT 上升、GPT 上升、發疹、噁心、嘔吐。

注意事項：1. 下列患者慎重投與

(1) 對於 penicillin 系抗生物質有過敏症之既往病史者。

(2) 本人或雙親、兄弟姊妹有易引起支氣管氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏症狀之體質的患者。

(3) 口服吸收不良患者或實施營養注射的患者。

2. 投藥期間及投藥後至少 1 星期，應避免飲酒。(酒精會引起 disulfiram like reaction，其交互作用機轉不明。)

3. 含 N-methylthiotetrazole (NMTT or MTT) 支鏈，可能因造成低凝血酶原血症 (hypoprothrombinemia)，而導致發生凝血功能異常的副作用。

安定性：配製後溶液應儘快使用，室溫可保存 24 小時。

懷孕期：Cefmetazole 在孕婦尚無足夠資料，應小心使用。

授乳期：Cefmetazole 在乳汁中含量尚無資料，應小心使用。

相容輸液：D5W、NS。