Cetrorelix Acetate

【ICETR】Cetrotide® 0.25mg/Vial

ATC Code : H01CC02

中文名：欣得泰凍晶注射劑 0.25 毫克 《台灣默克》

適應症：預防接受卵巢強效刺激排卵治療的患者，早發性的排出不成熟的卵。

藥理分類：Gonadotropin Releasing Hormone Antagonist.

用法用量：用法：皮下注射於下腹壁使用。

用量：

本藥一天給藥一次，每次投予一小瓶(含量 0.25 mg)，每次給藥間隔為 24 小時，可以選擇在早上或晚上給藥。

早上給藥：在使用尿液的或基因重組性腺刺激素(Urinary or recombinant gonadotropins)施以卵巢刺激的第 5 或第 6 天開始給予 Cetrotide 治療(大約在開始卵巢刺激後 96 到 120 小時之間給藥)，而且本藥應在使用性腺刺激素期間持續投予，包括誘導排卵日當天亦應給藥。

晚上給藥：在使用尿液的或基因重組性腺刺激素(Urinary or recombinant gonadotropins)施以卵巢刺激的第 5 天開始給予 Cetrotide 治療(大約在開始卵巢刺激後 96 到 108 小時之間給藥)，而且本藥應在使用性腺刺激素期間持續投予，直到誘導排卵日的前一天晚上為止。

不良反應：注射部位局部反應(紅疹、腫脹及搔癢)，輕度至中度的卵巢過度刺激症候群(OHSS)。

注意事項：

1. 首次使用本藥應在醫師指導下進行，若病人已瞭解過敏反應的症狀，也知道一旦發生症狀需馬上尋求醫療處置，接下來就可由病人自己施打。
2. 初次施打時，建議留置醫療單位觀察 30 分鐘左右，以防注射後之過敏/類過敏反應發生，若發生此類反應，需有能立即處置的設備。
3. 藉由更換注射部位、延長注射相同部位之時間間隔及緩慢注射藥物以利於逐步吸收，這些做法都可以減少注射部位的反應。
4. Cetrotide 只可以使用包裝內提供的溶劑調配，並以輕輕旋轉的方式加以混合。應避免劇烈混搖。
5. 配製好的溶液應立即使用。
6. 選取腹部的注射部位。最好是在肚臍的周圍。為了減少對皮膚的刺激，每天應選取不同的腹部位置。

懷孕期：禁用。

哺乳期：禁用。

保存：保存於 2-8°C。藥品小瓶應放置於外包裝盒中，以防光線破壞藥品成份。