

Glutathione

【IDAT】Dathione® (glutathione) Lyophilized inj 0.5g/Vial *ATC Code : V03AB32*

中文名：固樂達凍晶注射劑 500 毫克 《意欣國際》

適應症：胺基酸營養補充劑。

藥理分類：Amino acid.

用法用量：Administration:

以 10ml 無菌、無熱源雙蒸餾水溶解後使用，緩慢肌肉或靜脈注射。

Dosage regimen:

通常成人 1 次 100~200mg，依年齡、症狀適宜增減。

不良反應：

- (1) 休克:偶而有 Anaphylaxis 症出現時，應注意觀察，當出現顏面蒼白，血壓下降，脈搏異常時，中止給藥。
- (2) 過敏症:有發疹之過敏反應發生時中止給藥。
- (3) 胃腸:微有食慾不振，噁心，嘔吐。

注意事項：

1. 與 Vitamin B6、Vitamin K、Cyanocobalamine 混合時，應於 3 小時內注射完畢。
2. 應避免與 Promethazine HCl、Papaverine HCl、Dehydrocholic acid、Sodium Cefazolin、Kanamycin Sulfate 混合，否則會產生變化。

調製：以 10ml 無菌、無熱源雙蒸餾水溶解後使用，緩慢肌肉或靜脈注射。

安定性：溶解後應立即使用，若是分次使用，應保存冷處，且於八小時內用完。

儲存：應於 25°C 以下避光儲存。