

Hyoscine Butylbromide

【IBUE】Despas[®] Inj 20mg/1mL/Amp

ATC Code : A03BB01

【IBUEM】Despas[®] Inj 20mg/1mL/Amp

ATC Code : A03BB01

【IBUECM】排程 Despas[®] Inj 20mg/1mL/Amp

ATC Code : A03BB01

中文名： 攀怕斯注射液 «信東生技»

適應症： 胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣及其運動障害、尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。

藥理分類： Anticholinergic Agent.

用法用量： **Administration:** slow IV or IM or SC

Dosage regimens:

— Adults & adolescents over 12 years:

10~40 mg, repeated after 30 min prn; **MAX** 100 mg/day.

— Infants & Children ≤ 6 yr: in severe spasms cases

0.3~0.6 mg/kg several times daily; **MAX** 1.5 mg/kg/day.

不良反應： 口乾鼻塞、頭暈、視覺模糊、排尿困難、噁心、便秘等。

注意事項： 可供緩慢肌肉注射、靜脈注射或皮下注射。

禁忌： 未曾治療之窄角性青光眼、前列腺肥大伴有尿滯留、胃腸道機械性阻塞、麻痺或阻塞性腸阻塞、巨結腸症、心跳過速、重症肌無力禁用本劑。

懷孕期： Hyoscine-N-butylbromide 使用在孕婦上的資料是有限的。動物研究並未顯示本藥在生殖毒性方面有直接或間接的有害作用。

授乳期： Hyoscine-N-butylbromide 及其代謝物是否會經由人類的乳汁排除尚無充分的資訊。以預防來說，最好避免在懷孕及授乳期間使用本品。

備註： Despas[®] 20 mg/1mL/Amp 因程式連帶子項與胃鏡檢查排程需要之故，致其批價代碼不一。【IBUE】為 IVP 注射用碼，連帶 0.45% NS 20mL/Amp；【IBUEM】為 IM 注射用碼；【IBUECM】為胃鏡檢查排程用碼。