

N(2)-L-alanyl-L-glutamine

【IDIP】Dipeptiven® 20g/100mL/Bot

ATC Code : B05XB02

中文名：雙胍胺靜脈輸注液 «Fresenius Kabi»

適應症：做為一般非經腸道營養須額外補充麩胺（glutamine）的病人（如：異化過度或新陳代謝過度之病人）氨基酸溶液之補充品。

成分：Each mL contains:

N(2)-L-alanyl-L-glutamine 200 mg
(eq. to L-alanine 82mg, L-glutamine 136.4mg)
Water for Injection add to 100 mL

Theoretical Osmolarity **931** mosmol/L
Titration acidity 90~105 mmol NaOH/L
pH 5.4~6.0

藥理分類： Amino Acid.

用法用量：

- 必須與其他可相容溶液混合後靜脈輸注，當混合後滲透壓大於 800 mosmol/L 時，應由中心靜脈輸注。
- 劑量視病患異化代謝的嚴重性及對氨基酸的需求量而定。
- 最大日劑量：0.5g/kg/day(2.5mL/Kg/day)。

不良反應：皮膚搔癢、皮膚紅疹。

注意事項：1. 嚴重腎功能不全(creatinine 之清除率 < 25 ml/min)；嚴重肝功能不全；嚴重代謝酸血症患者禁用。
2. 開瓶後須立即使用。1 份容積的 Dipeptiven 與至少 5 份相容容積混合(NS、D5W、D5S、RL、Amino acid ,TPN)。
3. 靜脈滴注需超過 4 小時。
4. 若有中央靜脈導管，可不用稀釋直接自中央靜脈導管輸注。(廠商提供資料)

懷 孕 期： 因缺乏用於孕婦的經驗，不建議使用。

授 乳 期： 因缺乏用於授乳婦的經驗，不建議使用。