

Dobutamine HCl

【IDOBG】 Gendobu® 250mg/20mL/Vial

ATC Code : C01CA07

中文名： 健多博注射液 «健亞生技»

適應症： 增強心肌收縮力而適用於短期治療器質性心臟病、心臟外科手術引起心肌收縮力抑制而導致之心臟代償機能衰竭。

藥理分類： **Adrenergic Agonist Agent; Inotrope. (beta1-adrenergic, alpha1-adrenergic)**

用法用量： **Administration:** Administer via infusion device; administer into large vein.

Dosage regimens:

As an IV infusion of 2.5-40 mcg/kg/min. The usual dose is 2.5-10 mcg/kg/min. The dosage should be adjusted individually according to the patient's heart rate and rhythm, blood pressure and diuresis.

Dose (mcg/kg/min)	Infusion Rate (mL/kg/min)		
	250 mg Dobutamine in 1000 mL infusion	500 mg Dobutamine in 1000 mL infusion	1000 mg Dobutamine in 1000 mL infusion
2.5	0.01	0.005	0.0025
5	0.02	0.010	0.0050
7.5	0.03	0.015	0.0075
10	0.04	0.020	0.0100
12.5	0.05	0.025	0.0125
15	0.06	0.030	0.0150

不良反應： 噁心、頭痛、心悸、呼吸困難、胸痛。

注意事項： 1.肥厚型閉鎖性心肌症的患者不可使用。
2.使用於 A.F.的患者時，應先投予 cardiac glycoside，以免發生 V.F.。
3.不可與 sodium bicarbonate、furosemide 及 pH 8 以上之鹼性溶液混合。

懷 孕 期： 沒有證據顯示 dobutamine 會造成胎兒損害或產生畸型胎兒。但沒有控制和足夠的孕婦雙盲實驗。dobutamine 不建議用於懷孕婦女，除非是臨床的利益超過對胎兒可能造成的危險性。

授 乳 期： 授乳婦接受 dobutamine 治療期間，應停止哺乳。

安 定 性： 配製完成的輸注液，於室溫下放置不得超過 12 小時，在冰箱儲存不得放置超過 24 小時。

相容輸注液： D5W、NS、1/2NS、Dextrose 5% in Lactated Ringer's、Dextrose 5% in NaCl 0.45 or 0.9%、Lactated Ringer's。

儲 存： 室溫避光儲存。

備 註： 本品因 ascorbic acid 氧化作用，而造成溶液變成微黃色時，並不影響其效果及其安全性。