

Leuprorelin Acetate

【IELIG】Eligard® 22.5mg/Syringe

ATC Code : L02AE02

中文名： 癌立佳持續性藥效皮下注射劑 《安斯泰來》

適應症： 用於晚期前列腺癌紓解治療，以及與放射治療並用於高風險的局部和局部晚期賀爾蒙依賴型前列腺癌治療。

藥理分類： **Antineoplastic Agent, Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist.**

用法用量： **Note:** Gonadotropin-releasing hormone analogue as with other similar agents, the **use of gloves is recommended** during mixing and administration.

Administration: SubQ(subcutaneous)

- Vary/rotate injection site; choose site with adequate subcutaneous tissue (eg, upper or mid-abdomen, upper buttocks) that does not have excessive pigment, nodules, lesions, or hair.
- Avoid areas with brawny or fibrous tissues or areas that may be compressed or rubbed (eg, belt or waistband).
- Administer within 30 minutes of preparation.

Dosage regimen:

22.5 mg every 12 weeks SC

不良反應：熱潮紅、鼻咽炎、虛弱、噁心、疲累、短暫注射部位刺激。

- 注意事項：
- 1.於原包裝盒內在 2-8°C 冷藏。混合前 30 分鐘先由冰箱取出回溫。
 - 2.限皮下注射(選擇皮下組織足夠處，例如上或中腹部、臀部上方)，注射部位應每次變換。避免注射在會受壓或摩擦的部位(例如繫皮帶處)。
 - 3.勿搓揉注射部位。
 - 4.詳閱仿單「配製和其他操作的特別注意事項」，配製完成後須立即使用。
 - 5.本藥為每三個月使用一次劑型，需一次注射完畢，不可分割。

懷 孕 期： 婦女禁用。

授 乳 期： 婦女禁用。

給付規定： 用於前列腺癌