Leuprorelin Acetate

[IELIG] Eligard® 22.5mg/Syringe ATC Code: L02AE02

中文名: 癌立佳持續性藥效皮下注射劑 《安斯泰來》

適應症: 用於晚期前列腺癌紓解治療,以及與放射治療並用於高風險的局部和局部晚期

賀爾蒙依賴型前列腺癌治療。

藥理分類: Antineoplastic Agent, Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist.

用法用量: Note: Gonadotropin-releasing hormone analogue as with other similar agents, the use of gloves is recommended during mixing and administration.

Administration: SubQ(subcutaneous)

- Vary/rotate injection site; choose site with adequate subcutaneous tissue (eg, upper or mid-abdomen, upper buttocks) that does not have excessive pigment, nodules, lesions, or hair.
- Avoid areas with brawny or fibrous tissues or areas that may be compressed or rubbed (eg, belt or waistband).
- Administer within 30 minutes of preparation.

Dosage regimen:

22.5 mg every 12 weeks SC

不良反應:熱潮紅、鼻咽炎、虚弱、噁心、疲累、短暫注射部位刺激。

注意事項:1.於原包裝盒內在2-8℃冷藏。混合前30分鐘先由冰箱取出回溫。

- 2.限皮下注射(選擇皮下組織足夠處,例如上或中腹部、臀部上方),注射部位 應每次變換。避免注射在會受壓或摩擦的部位(例如繫皮帶處)。
- 3.勿搓揉注射部位。
- 4.詳閱仿單「配製和其他操作的特別注意事項」,配製完成後須立即使用。
- 5.本藥為每三個月使用一次劑型,需一次注射完畢,不可分割。

懷 孕 期: 婦女禁用。

授 乳 期: 婦女禁用。