

Vedolizumab

【IENTY】 Entyvio® Powder for Infusion 300mg/vial *ATC Code : L04AA33*

【IENT1】 (恩慈) Entyvio® Powder for Infusion 300mg/vial

中文名：安潰悠凍晶注射劑 300 毫克 «Hospira»

適應症：1.成人中度至重度活性潰瘍性結腸炎。2.成人中度至重度活性克隆氏症。3.中至重度活動性慢性結腸袋炎(Pouchitis)之成人病人。

藥理分類：**Gastrointestinal Agent; Monoclonal Antibody, Selective Adhesion-Molecule Inhibitor.**

用法用量：**Administration:**

IV: Infuse over 30 minutes. Do not administer by IV push or bolus.

Following infusion, flush with 30 mL of sterile 0.9% sodium chloride injection or Lactated Ringer's solution.

Observe patients during infusion (until complete) and monitor for hypersensitivity reactions; discontinue if a reaction occurs.

Indications and dosage:

Adult:

Crohn disease:

IV: 300 mg at 0, 2, and 6 weeks and then every 8 weeks thereafter. Discontinue therapy in patients who show no evidence of therapeutic benefit by week 14.

Ulcerative colitis:

IV: 300 mg at 0, 2, and 6 weeks and then every 8 weeks thereafter. Discontinue therapy in patients who show no evidence of therapeutic benefit by week 14.

Pouchitis :

- 建議使用方式為第 0 週、第 2 週、第 6 週以靜脈輸注 vedolizumab 300 毫克，之後以每隔 8 週給藥一次。

- 應與標準抗生素治療同時開始(如為期 4 週的 ciprofloxacin)。

- 第 14 週仍未出現 vedolizumab 治療效益證據的病人應停止治療。

重新治療：沒有已知結腸袋炎病人重新治療的資料。

不良反應：鼻咽炎、頭痛、關節痛、噁心、發熱、上呼吸道感染、倦怠、咳嗽、支氣管炎、流感、背痛、皮疹、搔癢、鼻竇炎、口咽疼痛和四肢疼痛。

注意事項：1. 開始安潰悠治療之前，所有患者均應依據最新疫苗接種準則，完成所有疫苗接種。接受安潰悠的患者，可接受非活毒疫苗(如，流感疫苗注射)，且若效益高於風險，可接種活毒疫苗。
2. 輸注期間到輸注完成之前，應持續觀察患者，因可能發生過敏反應。

相容稀釋液 無菌 0.9%氯化鈉溶液或乳酸林格爾注射液

懷孕期：僅應在母體效益高於胎兒風險時，才得以在懷孕期間使用。尚未進行安潰悠用於懷孕女性的試驗。

哺乳期：將 vedolizumab 用於哺乳女性時，須特別審慎。目前尚不清楚 vedolizumab 是否會進入人類乳汁。曾在泌乳猴子的乳汁中，偵測到 vedolizumab。