

Cetuximab

【IERB】 Erbitux® 100mg/20ml/Vial (健保給付)

ATC Code : L01XC06

【IERB1】 Erbitux® 100mg/20ml/Vial (非健保給付)

ATC Code : L01XC06

中文名： 爾必得舒注射液 « Merck »

適應症： 1.治療轉移性直腸結腸癌患者。2.治療局部晚期之口咽癌、下咽癌及喉癌患者。
3.治療復發及/或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌患者。

藥理分類： **Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Inhibitor; Antineoplastic Agent, Monoclonal Antibody.**

用法用量： **Administration and dosage regimens:**

(1)病人第一次輸注前，一定要先給予抗組織胺藥劑及皮質類固醇。並建議之後的每一次輸注都要先給予抗組織胺藥劑及皮質類固醇。

(2)在治療上，為一星期輸注一次，起始劑量是 400mg/ m²，輸注時間是 120 分鐘。之後每一星期的劑量是 250mg/ m²，建議的輸注時間是 60 分鐘。

直腸結腸癌：

- 與化學治療合併使用於治療轉移性之直腸結腸癌病人。開始用 Erbitux®的治療之前，必須確定是 RAS (KRAS 和 NRAS) 原生型。
- 必須在輸注一小時之後，才能給予後續之化學療法。建議持續治療直至病情惡化。

口咽癌、下咽癌及喉癌：

- 與放射線療法合併使用，治療局部晚期之口咽癌、下咽癌及喉癌病人。
- 建議在接受放射線療法的前一週開始 Erbitux®的治療且持續使用 Erbitux®治療至放射線治療期結束。

復發及/或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌：

- Erbitux®與內含 platinum 類之化學療法合併使用，治療復發及/或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌病人。
- 必須在輸注 Erbitux®一小時之後，才能給予 platinum 類之化學療法。建議持續 Erbitux®治療直至病情惡化。

不良反應： 肝臟酵素值增加 (ASAT、ALAT、AP)；低血鎂症；輕到中度輸注相關反應、輕到中度黏膜炎可能導致之鼻出血；頭痛；結膜炎；腹瀉、噁心、嘔吐；脫水，特別是續發性腹瀉或黏膜炎；低血鈣症；厭食所導致的體重減輕；疲勞。

注意事項： 1.調製後在冷藏(2~8℃)下不得超過 24 小時。
2.首次劑量應緩慢給藥，輸注速率不可超過 5mg/min。最快的輸注速率不能超過 10 mg/min。
3.輸注時一定要單獨使用一條管線，輸注結束時一定要用無菌的 NaCl 溶液沖洗管線。
4.病人第一次輸注前，一定要先給予抗組織胺藥及皮質類固醇。並建議之後的每一次輸注都要先給予抗組織胺藥劑及皮質類固醇。

懷 孕 期： 強烈建議，只有當可能的效益超過對胎兒的可能危險性時，才可以給予孕婦或沒有適當避孕措施的婦女使用。

授 乳 期： 建在治療期間和最後一劑治療後的二個月內的婦女，不要哺餵母乳，因為尚未知是否會從母乳排出。

安 定 性： 因不含有任何抗菌的防腐劑或抑制細菌的藥劑，建議於配製後 24 小時內使用。

儲 存： 保存在冰箱(2~8℃)。