

Human Papillomavirus 9-valent Vaccine, Recombinant (type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

【IGARD】自費 Gardasil 9[®] 0.5mL/Syringe

ATC Code : J07BM03

中文名：嘉喜 [九價人類乳突病毒基因重組疫苗] «MSD»

適應症：GARDASIL 9 適用於 9 至 45 歲的人施打，使其產生主動免疫反應，以預防下列由人類乳突病毒(HPV)所引起的病變：

- 由第 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 及 58 型 HPV 所引起的子宮頸、外陰、陰道及肛門部位的癌前病變與癌症。
- 由第 6 及 11 型 HPV 所引起的生殖器疣(尖形濕疣)。

用法用量：**Administration:** intramuscularly only (shake well before use).

Dosage regimen:

Recommended immunization schedule:

Gardasil 9 應依下列時間表以肌肉注射的方式各施打一劑 0.5 毫升的劑量。

年齡	施打方案	施打時間
9 至 14 歲	2 劑	0, 6~12 個月*
	3 劑	0, 2, 6 個月
15 至 45 歲	3 劑	0, 2, 6 個月

*若第二劑施打時間距離第一劑小於 5 個月，則需於距離第二劑施打後至少 4 個月後施打第三劑。

不良反應：注射部位反應（如疼痛、紅疹、腫脹）及發燒等。

注意事項：

- 1、Gardasil 9[®]應以**肌肉注射**的方式施打於上臂的三角肌區域，或是大腿前外側區域較高的部位。施打後應觀察 15 分鐘。使用之前必須**徹底搖勻**，使疫苗保持懸浮液的狀態。
- 2、接種第一劑之後才懷孕，後續劑量必須等產後再繼續施打。接種本疫苗期間如有懷孕，不需終止懷孕。
- 3、若第二劑施打時間距離第一劑小於 5 個月，則需於距離第二劑施打後至少 4 個月後施打第三劑。
- 4、接種本疫苗後，女性仍須定期接受子宮頸抹片檢查。
- 5、正在罹患子宮頸癌或癌前期的女性，不建議接種。

懷孕期：對孕婦的安全性及有效性尚未確立。只有在明確必要的情況下才可於懷孕期間使用 Gardasil 9[®]。

授乳期：目前並不確知 Gardasil 9[®]是否會分泌進入人類的乳汁。因此，對授乳婦女施打 Gardasil 9[®]時應謹慎。

儲存：冷藏 2-8 °C，避光儲存。切勿冷凍。在離開冷藏環境(在 8°C 至 25°C 的溫度下)的總時間(多次短程運送的累積時間)不超過 72 小時的情況下仍可使用。

備註：本品健保不給付。