

## Ertapenem Sodium

【IINV】 Invanz<sup>®</sup> 1g/Vial

ATC Code : J01DH03

中文名： 益滿治注射劑 «MSD»

【IERT】 Ertacure<sup>®</sup> 1g/Vial

ATC Code : J01DH03

中文名： 厄他可注射劑 1 公克 «松瑞製藥»

適應症： 用於治療成人病患由具感受性之微生物所引起的中度至重度感染，而且適用於下列感染在尚未鑑定出病原菌之前按經驗的治療處理：複雜的腹腔內感染；複雜的皮膚和皮膚組織感染；感染性肺炎(community acquired pneumonia)；複雜的尿道感染包括腎盂炎；急性骨盆感染，包括產後子宮內肌炎、敗血性流產和手術後婦科感染。

藥理分類： **Antibiotic, Carbapenem.**

用法用量： **Administration:** IV infusion over 30 min or IM injection.

### Indications and dosage regimens:

#### Adults with normal renal function:

— Gynecologic infections: 1g once daily for 3-10 days.

— Intra-abdominal infections:

1 g once daily for 5-14 days.

— Community-acquired pneumonia / Urinary tract infection (UTIs) :

1 g once daily. Usual duration is 10-14 days; treatment may be switched to an appropriate oral anti-infective after 3 days.

— Skin/skin structure infections:

1 g once daily for 7-14 days.

#### Adults with impaired renal function:

— Clcr < 30 mL/min: 500 mg every 24 hr.

— Hemodialysis:

500 mg every 24 hr; supplemental dose of 150 mg after dialysis if last 500 mg dose given within 6 hr of dialysis, no supplemental dose necessary if last 500 mg dose given at least 6 hr prior to dialysis.

Safety and efficacy not established in children < 18yrs

不良反應： 腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛、輸注部位之併發症、精神狀態改變、皮疹、陰道炎、過敏反應、黴菌感染。

注意事項： 1.不可與其它藥品混合或同時輸注。  
2.不可使用含有葡萄糖(dextrose)的稀釋液。

懷 孕 期： 目前尚無有關懷孕婦女之適當及設計良好的對照試驗。僅有在對母體及胎兒的潛在益處大於危險性時，才可在懷孕期間使用。

授 乳 期： Ertapenem 會分泌至母乳中，授乳婦必須謹慎小心。

配 製： 1.IV：每小瓶加入 10 mL 的注射用水、NS 或制菌的注射用水。充分振搖溶解，並立刻將溶液移至 50 mL 的 NS 中。完成稀釋的藥品須在 6 小時內完成輸注。  
2.IM：每小瓶加入 3.2 mL 的 1% lidocaine HCl 注射液(不含 epinephrine)，充分振搖溶解。調配完成的肌肉注射溶液必須在 1 小時內使用。

安 定 性： 乾粉經溶解並立即以 NS 稀釋後，可放在室溫(25 °C)於 6 小時內使用，也可冷藏(5 °C)至多 24 小時，且冷藏取出後須於 4 小時內使用。藥品溶液不可冷凍。

儲 存： 凍晶乾粉之儲存不可超過 25 °C。

\*\*全民健保藥品給付規定：

- 1、臨床上為中、重度細菌感染，且經其他抗微生物製劑治療仍 無法控制病情者，但限用於：(1)複雜的腹腔內感染、(2)感染性肺炎、(3)急性骨盆感染。
- 2、經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者（申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料）。