

N(2)-L-Alanyl-L-Glutamine

【IKIN】(自費) Kinpominn[®] for IV Infusion 6000mg/30mL/Bot

ATC Code : B05XB02

中文名： 貝力多靜脈輸注液 «南光化學»

適應症： 做為一般非經腸道營養須額外補充麩胺(glutamine)的病人(如：異化過度或新陳代謝過度之病人)氨基酸溶液之補充品。

藥理分類： **Amino Acid; Gastrointestinal Agent, Miscellaneous**

用法用量：

Administration:

- 由中心或周邊靜脈給予，視混合後的溶液滲透壓而定。
- 靜脈輸注時，應先以相容之輸注液 250mL 稀釋，稀釋後，滴注 30~45 分鐘。(廠商資料)

Dosage regimens:

日劑量:1.5-2.0 毫升/公斤體重(即 0.3-0.4 公克 N(2)-L-alanyl-L-glutamine 公斤體重);相當於施用 100~140 毫升於體重 70 公斤之病人。

最大日劑量：2 毫升胺基酸/公斤體重(即 0.4 公克 N(2)-L-alanyl-L-glutamine/公斤體重)。

不良反應： 輸注過快可能冷顫、噁心、嘔吐，此時應立即停止輸注。皮膚搔癢、紅疹。

禁忌： 嚴重腎臟功能不全(creatinine 之清除率<25ml/min)、嚴重肝臟功能不全、嚴重代謝性酸血症、對本產品任一成分過敏。

注意事項：

- 本藥是高濃度輸注液，不可直接使用，必須和相容溶液混合後才可以輸注。
- 一份容積之本藥需與至少 5 份容積之相容溶液混合(例如 100 毫升本藥+500 毫升以上之胺基酸溶液)，有效成分最高濃度不超過百分之 3.5。
- 混合後透壓大於 800mosmol/L 時，應由中心靜脈輸注。輸注速度視所混和之溶液而定，最快不可超過 0.1 公克胺基酸/公斤體重/小時。

懷 孕 期：

1. 無相關數據，不建議使用。
2. Endogenous glutamine can be detected in cord blood and concentrations are decreased in low birth-weight infants (Ivorra 2012)..

授 乳 期：

1. 無相關數據，不建議使用。
2. Endogenous glutamine is present in breast milk.

儲 存： 存放在 15~25°C。