

Measles, combinations with mumps & rubella, live attenuated

【I2MMR】公費 MMR II 疫苗 (M-M-R II®) 0.5mL/Vial

ATC Code : J07BD52

【IMMR】自費 MMR II 疫苗 (M-M-R II®) 0.5mL/Vial

ATC Code : J07BD52

中文名： 麻疹、腮腺炎及德國麻疹三種混合疫苗注射劑 «MSD»

適應症： 預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹。

成分： Each dose contains:

Measles Virus Vaccine ..... 1000 TCID<sub>50</sub>

Mumps Virus Vaccine ..... 20000 TCID<sub>50</sub>

Rubella Virus Vaccine ..... 1000 TCID<sub>50</sub>

Neomycin ..... 25 mcg

用法用量： The dose for any age is 0.5 mL administered SC, preferably into the outer aspect of the upper arm.

ACIP recommends administration of the first dose of M-M-R® II at 12-15 months of age and administration of the second dose of M-M-R® II at 4-6 years of age.

不良反應： 可能會引起發燒、腹瀉、蕁麻疹、肌肉痛或發燒性痙攣等。

交互作用： 可與減毒水痘疫苗 (Varilrix®) 同時接種 (分別注射在不同位置)。

注意事項： 1、不可用於靜脈注射。

2、應在配製完後儘可能立即予以注射，勿超過 8 小時。

3、懷孕婦女禁用，接種疫苗後 3 個月內應避免懷孕。

4、禁用於對 Neomycin 產生全身性過敏症狀之患者；具有 Neomycin 所致接觸性皮膚炎病史則非本劑之禁忌症。

儲存： 須置於冰箱中 (2-8 °C) 避光儲存。