

Nalbuphine sebacate

【INALD】 Naldebain® ER injection 150 mg/2 mL/Vial

ATC Code : N02AF02

中文名： 納疼解長效注射液 «英特瑞»

適應症： 對預期手術後之中、重度急性疼痛，以預先給藥的方式緩解。

藥理分類： Analgesic, Opioid; Analgesic, Opioid Partial Agonist.

用法用量： **Administration: for IM only.**

Dosage regimen;

Slow IM 150mg single dose.

不良反應： 注射部位反應、發熱、暈眩、嘔吐、噁心

交互作用：

- LITHIUM: ↑ risk of serotonin syndrome.
- CLOPIDOGREL: ↓ efficacy of clopidogrel.
- DONEPEZIL: ↓ seizure threshold.
- CETIRIZINE: ↑ risk of CNS depression.
- SCOPOLAMINE: ↑ risk of drowsiness, dizziness, and disorientation.
- METOCLOPRAMIDE: ↑ risk of CNS depression.

注意事項：

- 1.使用前需回復至室溫。
- 2.僅供肌肉注射途徑使用，注射於臀大肌外側上部四分之一處。
- 3.藥品溶液為黏稠油狀，需緩慢注射。
- 4.注射完畢時輕壓注射部位防止藥液滲出，注射部位**不可按摩**。
- 5.肝功能不全者須小心使用。
- 6.本品為緩釋藥劑，到達療效需 12-24 小時。

懷 孕 期：

- 1.確實必要時才給予。
- 2.動物實驗未發現對胎兒造成損傷，但尚無孕婦之相關安全資料。

授 乳 期：

可能少量（投予劑量的百分之一）會分泌至乳汁中。本藥投予哺乳婦女須小心。

儲 存：

存放在原包裝盒內避光於 25°C 以下保存。