

Amino Acid

【INEP】Nephrosteril 7%® 250 mL/Bot

ATC Code : B05BA01

中文名：腎福諾輸注液 «費森尤斯卡比»

適應症：不能攝取適當食物之患者之補助治療劑，蛋白質之消化吸收機能或合成利用障礙，嚴重創傷火傷骨折時蛋白質之補給，蛋白質攝取減少之營養失調症。

成分：

Ingredient contents(mg/dL)		Ingredient contents (mg/dL)	
Essential amino acids		Nonessential amino acids	
L-Isoleusine	510	Arginine	490
L-Leucine	1030	L-Histidine	430
L-Lysine	710	Aminoacetic acid	320
L-Methionine	280	L-Alanine	630
L-Phenylalanine	380	L-Proline	430
L-Threonine	480	L-Serine	450
L-Tryptophan	190	L-Malic Acid	150
L-Valine	620	L-Cysteine	37
		Glacial acetic acid	138
Total Amino Acids	7000	Total Nitrogen	1080
Ingredient contents(mg/dL)		Ingredient contents (mg/dL)	
Osmolarity (mosm/L)	645	Caloric Value (Kcal/L)	280

藥理分類：Amino Acid

用法用量：用法：IV infusion(本品理論滲透壓為 645 mosm/L)。

用量：

一般急慢性腎功能不全而未進行血液透析患者：

最高劑量每天每公斤體重 0.5 公克胺基酸，以 70 公斤體重計算，約等於每天 500 毫升。

進行血液透析和血液過濾的急慢性腎功能不全患者：

最高劑量每天每公斤體重 1 公克胺基酸，以 70 公斤體重計算，約等於每天 1000 毫升。

最大劑量：最大劑量每天每公斤體重 1.5 公克胺基酸：

以 70 公斤體重計算，約等於每天 1500 毫升，熱量必須預先或同時以口服或非口服方式供給。

使用期間：(duration of application)

- 急性腎功能不全患者連續使用若干天至最多二週。
- 沒有進行血液透析、血液過濾或腹膜透析治療的慢性腎功能不全患者，可連續使用直到可以口服蛋白質為止。

不良反應：輸注速率過快可能引起噁心、寒顫或嘔吐。

注意事項：1.本溶液不含電解質，須注意血中電解質濃度。必要時加足夠的鉀以確保胺基酸的合成或利用。

2.本溶液可引起胃液分泌及加重潰瘍。

儲存：25°C 以下避光儲存。

備註：本品健保不給付。