

Piracetam

【INOOP】Noopol® Injection 1g/5mL/Amp

ATC Code : N06BX03

中文名：腦寶注射液 «南光化學»

適應症：對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。

藥理分類：Antimyoclonic, Miscellaneous; Nootropic.

用法用量：**Administration:**
IM or IV

Cerebrovascular insufficiencies & age-associated cognitive impairment:

1 g/vial 3 times daily (Max 10-15 g/day)

不良反應：頭痛、痙攣、暈眩、錐體外症狀及胃腸道症狀(噁心、嘔吐、厭食、下痢、便秘、及胃痛)。

交互作用：

- Piracetam may ↑ the anticoagulant effect of Urokinase, Enoxaparin, Heparin.
- Piracetam may ↑ the antiplatelet effect of Clopidogrel, Prasugrel, Acemetacin, Aspirin, Dipyridamole, Etodolac, Ibuprofen, Indomethacin, Ketoprofen, Ketorolac, Mefenamic Acid, Meloxicam, Naproxen, Piroxicam, Sulfinpyrazone, Ticagrelor, Ticlopidine, Tirofiban, Venlafaxine, Fluoxetine, Paroxetine, Citalopram, Sertraline, Piracetam, Cilostazol.

注意事項：1.靜脈或肌肉注射皆可。
2.若發生眩暈，請不要開車或使用危險機械。
3.由於 piracetam 經由腎排泄，腎機能不全者須特別注意。

禁忌：嚴重腎臟機能不全者禁用。

懷孕期：Piracetam 會通過胎盤。除非必要，懷孕期間不應使用 piracetam。

授乳期：Piracetam 會滲入乳汁。授乳期間應避免使用 piracetam 或治療期間應停止授乳。