

Cisplatin

【IPLAK】Kemoplat® 50mg/50mL/Bot

ATC Code : L01XA01

中文名：克莫抗癌注射劑 «Fresenius Kabi»

適應症：抗惡性腫瘤劑。

藥理分類： **Antineoplastic Agent, Alkylating Agent; Platinum Analog.**

用法用量：**Administration** : IV infused over 30 minutes to 4 hours, at a rate of 1 mg/minute, or as a continuous infusion; infusion rate varies by protocol (refer to specific protocol for infusion details). Do not administer as a rapid IV injection.

Indications and dosage regimens :

Metastatic testicular cancer:

Adults, 20 mg/m² IV daily for 5 days, repeat Q3W for 3 cycles or more, usually used in therapeutic regimen with bleomycin and vinblastine.

Metastatic ovarian cancer, head and neck cancers, lung cancer, esophageal cancer:

Adults, 100 mg/m² IV repeat Q4W or 50 mg/m² IV Q3W with concurrent doxorubicin HCl therapy (ovarian cancer only). Give as IV infusion in 1 liter of solution with 37.5 g mannitol over 6-8 hrs.

Advanced bladder cancer:

Adults, 50-70 mg/m² IV once every 3-4 weeks.

不良反應：骨髓抑制、噁心、嘔吐、胃腸障礙、腎毒性、聽力障礙、過敏症狀、電解質異常。

注意事項：1. 投與本劑時，勿使用針頭、IV 滴注管或其他含鋁之設備，以免形成 platinum 之黑色沈澱。
2. 皮膚或黏膜意外接觸到含 cisplatin 溶液時，應立即用肥皂及水清洗該部位。
3. 建議給予 cisplatin 劑量前 8-12 小時，先給予 1 至 2 公升靜脈輸液。
4. 靜脈輸注時間：0.5-4 小時(*UpToDate*)，或 6-8 小時(仿單，稀釋於 2 公升輸注液中)。

懷 孕 期：不建議使用於懷孕婦女。使用 cisplatin 治療的育齡婦女應進行適當的避孕，且唯有在潛在效益大於治療危險時，才可使用。如果患者在接受本藥治療期間懷孕，應告知其本藥對胎兒可能產生的危害。

授 乳 期：cisplatin 會由乳汁中排出。由於其對新生兒的潛在性危險，因此建議哺乳的婦女，在接受 cisplatin 治療期間應停止哺乳。

安 定 性：1. 配製後室溫下可維持 24 小時。
2. 配製後溶液，若 6 小時之內還不要使用，則須避光。

相容輸注液：請勿僅以 5% 葡萄糖溶液稀釋本品(仿單)。稀釋於 2 公升之 5% 葡萄糖於 1/2 至 1/3 生理食鹽溶液(內含 37.5g mannitol)。

儲 存：室溫避光。