

Pneumococcal Vaccine, Polyvalent

【IPNE】自費 Pneumovax 23® 0.5mL/Vial

ATC Code : J07AL01

【I2PNE】預防保健成人肺鏈 Pneumovax 23® 0.5mL/Vial

ATC Code : J07AL01

中文名：紐蒙肺多價性肺炎雙球菌疫苗 «MSD»

適應症：預防肺炎雙球菌性肺炎及肺炎雙球菌性菌血症。

藥理分類：Vaccine; Vaccine, Inactivated (Bacterial).

用法用量：Administration:

SC or IM (preferably in the deltoid muscle or lateral mid-thigh).

Do not inject IV or intradermally.

Indications and dosage regimens:

Adults & Children > 2 yr:

0.5 mL as single dose.

不良反應：發燒、噁心、過敏、肌肉痛、頭痛或注射部位之酸痛、灼熱、紅斑、腫脹等。

注意事項：

1. 必須皮下(subcutaneous)或肌肉(intramuscular)注射。
2. 不可靜脈或皮內注射(intradermal)。※皮內(intradermal)注射可能造成嚴重的局部反應。
3. ACIP 表示同時接種肺炎雙球菌疫苗和流行性感感冒疫苗時（分別注射在不同手臂），不會增加副作用或減少對任一種疫苗的抗體反應。
4. ACIP 建議先前曾接種 PNEUMOVAX 23 或肺炎鏈球菌接合疫苗之高危險群者再追加接種疫苗。ACIP: The Advisory Committee on immunization Practices
5. 本疫苗與 Zostavax (伏帶疹活性帶狀疱疹疫苗)注射應間隔至少 4 週。

懷 孕 期：尚無用於孕婦的相關安全資料，唯有確實需要時才投與。

授 乳 期：尚未知本品是否會分泌至母乳中，注射本品之授乳婦須注意。

儲 存：未開的藥瓶或已開的藥瓶均須存放在冰箱中（2-8 °C）儲存。