

## Alirocumab

【IPRA】 Praluent® 75mg/Pre-filled pen

ATC Code : C10AX14

中文名：保脂通注射劑 «Sanofi»

適應症：對於已接受最高耐受劑量 statin，但低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)仍無法達到目標值之異合子家族性高膽固醇血症(HeFH)或動脈粥狀硬化心血管疾病(clinical ASCVD)之成人患者，Praluent 可作為飲食外的輔助治療。對 statin 不耐受或禁用 statin 之原發性高膽固醇血症(異合子家族性及非家族性)或混合型血脂異常之成人患者，Praluent 可單獨或併用其他降血脂藥物，作為飲食外的輔助治療。

藥理分類：Antilipemic Agent, PCSK9 Inhibitor; Monoclonal Antibody.

用法用量：Administration: subcutaneously.

The usual starting dose is 75 mg once every 2 weeks.

Patients requiring larger LDL-C reduction may be started on 150 mg once every 2 weeks, or 300 mg once every 4 weeks (monthly).

不良反應：上呼吸道症狀(流鼻水、打噴嚏、咽喉疼痛)、皮膚搔癢或注射部位紅腫癢痛。

注意事項：1.皮下注射。注射後不要搓揉。  
2.使用前應先回復至室溫(約需 30-40 分鐘)，回溫後，注射筆不可再放回冰箱。  
3.若漏打一次劑量，應儘快於漏打後七天內補打該次藥物，並依原注射時程繼續治療。若未能於漏打後七天內補打該次注射藥物，則不須補打，依原注射時程繼續治療。  
4.不可注射於有正在發作的皮膚疾病或受傷的部位，例如曬傷、皮疹、發炎或皮膚感染。

懷 孕 期：對孕婦安全尚未有完善資料，除非臨床上需要，否則不建議使用本藥。

授 乳 期：尚未有完善資料，建議停止哺乳，或是不使用本藥。

儲 存：開封前應冷藏(2~8°C)儲存，不可冷凍。回溫後，注射筆不可再放回冰箱。於 25°C 以下最多不得超過 30 天。