

Progesterone

【IPROG】Progesterone® 50mg/1mL/Amp

ATC Code : G03DA04

中文名：黃體素注射液 «臺裕化學»

適應症：無月經、機能性子宮出血、迫切性流早產、習慣性流早產、月經困難、黃體機能不全所致之不孕症。

藥理分類：Progestin.

用法用量：Administration: Intramuscular injection.

Indications and dosage regimens:

Secondary amenorrhea, diagnostic aid ("progesterone challenge"):

5 to 10 mg/day for 6 to 8 consecutive days.

(IM route of administration is considered nonpreferred to oral and is infrequently used)

Uterine bleeding, abnormal:

5 to 10 mg/day for 6 doses. Start 2 weeks after estrogen therapy (if also being used). Bleeding should cease within 6 days. Discontinue use if menstrual flow begins during therapy..

Habitual abortion:

10-20 mg twice weekly.

仿單：

一日 10~50mg，分一次或二次肌肉注射之。

不良反應：注射部位疼痛、水腫、嗜睡、噁心、嘔吐、下痢、頭痛、倦怠感。

注意事項：

1. 本品不可靜脈注射。
2. 肌肉注射時，儘量避免同一部位反覆行之。
3. 嚴重肝病患者不建議使用。

懷 孕 期：黃體荷爾蒙劑之使用與先天異常兒生產之因果關係尚未確立，但是根據調查妊娠初期服用黃體卵泡荷爾蒙之母親生產心臟四肢等先天異常兒之概率比未服用該劑之概率高之報告。

授 乳 期：Progesterone 會分泌至乳汁，須謹慎使用。

儲 存：25℃ 以下避光貯存。