

Ceftriaxone Sodium

【IROCI】 Chef® For Injection 1g/Vial

ATC Code : J01DD04

中文名：捷復注射劑 《瑞安大藥廠》

適應症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

藥理分類：Antibiotic, Cephalosporin (**Third Generation**).

用法用量：**Administration:** Intermittent IV infusion over 15-30 minutes in adult; 10-30 minutes in neonates or children, or deep IM (in 3.6 mL, 250mg/mL).

Indications and dosage regimen:

Severe infections caused by susceptible organisms:

—Adults:

1 to 2 g **IV** QD or Q12h; MAX 4 g/day.

—Children \leq 12 yrs:

50 to 75 mg/kg **IV** daily in divided doses Q12h; MAX 2 g/day.

Meningitis:

—**Adults & Children > 12 yrs:**

2 g **IV** Q12h or 50 to 100 mg/kg QD for 7 to 21 days depending on severity of infection or bacteria involved. MAX 4 g/day.

—**Neonates & Children \leq 12 yrs:**

100 mg/kg **IV** QD or Q12h for 7 to 21 days. MAX 4 g/day.

Disseminated gonococcal infections:

—Adults:

1g **IV** daily, until 1 or 2 days after improvement begins.

Meningococcal disease, chemoprophylaxis after close contact with high-risk patient:

—Adults: 250 mg deep **IM**.

—Neonates & Children \leq 12 yrs: 125 mg deep **IM**.

Empiric therapy in febrile neutropenic patients (adjunct to amikacin):

Adults: 30 mg/kg **IV** once daily.

Surgical prophylaxis:

Adults: 1 g **IV** 30 minutes to 2 hours before surgery. For patients with both hepatic impairment and severe renal impairment, maximum dose is 2 g/day unless drug level is monitored closely.

不良反應：腸胃道不適、血液學上的變化(嗜伊紅血球增多、白血球減少症、顆粒性細胞減少症、溶血性貧血、血小板減少症)、皮膚反應。

注意事項：1.高膽紅素血症的新生兒在使用本藥治療時要特別注意，因為有發展成 bilirubin encephalopathy 的危險性，因此本藥不應用於新生兒(尤其是早產兒)。
2.本品不可使用於對 cephalosporins 過敏者；對 penicillin 產生過敏之病患，對本品亦可能產生過敏。
3.未滿 28 (\leq 28) 天的新生兒正以靜脈注射方式接受含鈣藥品及營養品，則這些新生兒不應再投予 ceftriaxone 成分之注射劑。
4.大於 28 ($>$ 28) 天以上的病人，可以相繼使用含 ceftriaxone 與含鈣藥品，但是輸注管必須完全以可相容的溶液沖洗。
5.ceftriaxone 與含鈣藥品不應以 Y 型管同時投予病人。
6.不可以將 ceftriaxone 與含鈣產品，包括 Ringer's 或 Hartmann's 溶液或非口服方式之含鈣營養品等混合使用。

懷 孕 期：

- Ceftriaxone 會穿透胎盤。對於人類懷孕之安全性尚未建立。在靈長類動物並未觀察到胚胎毒性或致畸胎性。
- (仿單)第一孕期期間，除非病情絕對必要，請勿投予。

授 乳 期： 低濃度 ceftriaxone 會分泌至母乳中，應小心使用。

安 定 性： 配製後溶液室溫可保存 6 小時，2-8 °C 可保存 24 小時。

相 容 輸 注 液： D5W、D10W、NS、Dextrose 5% in NaCl 0.45% 等。

健 保 規 定：用於疑似或證實為淋病尿道炎、子宮頸炎、軟性下疳，可第一線單一劑量使用。